

中国基层医药[®]

CHINESE JOURNAL OF PRIMARY MEDICINE AND PHARMACY

半月刊 1994年7月创刊 第21卷 增刊2 2014年12月31日出版

主管
中华人民共和国国家卫生和
计划生育委员会

主办
中华医学会
100710,北京市东四西大街42号

安徽医科大学
230032,安徽省合肥市梅山路81号

编辑
中国基层医药编辑委员会
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6664827
(0554)6665318
Email:cjpmvip@163.com
http://www.cjpm.com

总编辑
吴孟超 郑芙林

编辑部主任
黄政

出版
中国基层医药杂志社
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6665318,6664827
Email:cjpmvip@163.com

广告经营许可证号
340400000010

印刷
蚌埠光大彩色制印有限公司

发行
范围:公开
国内:北京报刊发行局
国外:中国国际图书贸易集团
有限公司
(北京399信箱,100044)
代号 M4777

订购
全国各地邮政局
邮发代号 82-948

邮购
中国基层医药杂志社
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6665318,6664827
Email:cjpmvip@163.com

定价
每期10.00元,全年240.00元

中国标准连续出版物号
ISSN 1008-6706
CN 34-1190/R

2014年版权归中华医学会所有

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,可向中国基层医药杂志社出版发行部调换

目次

论著

- 外科重症监护病房老年患者呼吸机相关性肺炎相关因素分析及防治 俞申燕 瞿昌晶 郭旋等 1
- 乳腺疾病诊断中影像学检查的灵活应用 董艳 4
- 血脂康维持治疗老年人高脂血症的临床疗效观察 王阳 7
- 团体催眠辅导对癌症患者焦虑和抑郁情绪的影响 蒋连英 邹佩 金福妹 9
- 阿糖腺苷联合干扰素 $\alpha 2b$ 雾化吸入治疗小儿疱疹性咽峡炎58例疗效观察 李会 邵媛媛 张艳等 12
- 两种方案用于肩关节镜术后镇痛效果比较 王晶 李大鹏 李俊玲 15
- 临终期肿瘤患者120例肺部感染病原菌分析 曾斌 景建军 尹挺立等 18
- 腹腔镜子宫内位症93例彩色多普勒超声诊断分析 张淑琴 20
- 高位气管切开术在急诊喉气管外伤的应用价值 徐松波 刘成珠 荣毅 22
- 麝香保心丸联合比索洛尔治疗不稳定型心绞痛疗效探讨 于康宁 张秀芳 23
- 鹿茸品种的性状鉴别分析 李楚芬 翁雪芬 朱志伟 25
- 妊娠合并急性阑尾炎16例临床分析 刘丽华 李梦思 27
- 声信息治疗耳鸣40例临床分析 罗世柏 周雅丽 罗艳红 29

研究与实践

- 中国30年眼睑炎与睑腺炎的防治Meta分析 梁韶春 王娜 梁丽丽等 30
- 闭合复位股骨近端抗旋转髓内针治疗老年人股骨粗隆间骨折38例 杨庆森 白振国 32
- 胰岛素泵在糖尿病患者围手术期的临床应用 万云波 李峥峻 33

美托洛尔联合坎地沙坦治疗充血性心力衰竭 62 例疗效观察	王官凤 刘士兰 许诺	34
女性冠心病患者心电图表现与冠状动脉病变的相关性	魏力华	36
导管接触溶栓治疗下肢深静脉血栓 50 例临床疗效分析	张金柱 张丽	37
腹腔镜与小切口手术治疗急性结石嵌顿性胆囊炎疗效分析	杨新安	39
一起由埃可病毒 30 型所致脑炎暴发疫情调查	王增良 尹保行 倪丽丽等	40
小切口顶泌汗腺清除术治疗 2 100 侧腋臭分析	刘雄彪 汪晓红	42
单纯疱疹 A16 病毒 VPI 序列变异与小儿中枢神经系统损伤的关系	赵娟 赵霞 汪宏等	44
自拟小儿肺炎汤颗粒剂配合针刺疗法治疗小儿支气管肺炎 32 例	李冬梅	48
京万红软膏治愈阴囊湿疹并感染四例	盛彦峰 李敬宽 刘芳	49

综 述

老年高血压患者社区保健供求分析	王晓晴 于晓雯 管阳太	50
-----------------------	-------------	----

健康教育

上门随访对喉癌术后保留气管套管出院患者的影响	杨红珍 王前英	51
------------------------------	---------	----

卫生管理

《药讯》在基层医院临床药学工作开展中的作用	徐洪亮 张雅奇	53
与社区卫生服务相结合的社区康复模式	胡东侠 李东梅	54

护理学

PDA 移动护理系统在儿科优质护理中的应用	叶亚娜 顾军养	56
全程优质护理在全喉切除围手术期中的应用	王前英 杨红珍	57
高龄患者无痛胃镜检查术后的复苏护理	王洁琼	59
紫杉醇致急性血压升高一例观察与护理	严培芳	60
硫糖铝口服混悬液治疗急性放射性食管炎的观察与护理	章艳 方伟虹	62
重症海蜇蜇伤 56 例的救治护理	许雪琴 王兵 杨卉	63

病例报告

妊娠合并肥厚型心肌病一例	梁媚珍 江均贤 姚剑锋	后插 1
彩色多普勒超声诊断颈动脉-海绵窦瘘二例	敬思猛	后插 2

中华医学会系列杂志一览表	封二
--------------------	----

《中国基层医药》杂志第三届编辑委员会成员名单	对正文
------------------------------	-----

《中国基层医药》杂志可直接用缩写的常用词汇	封三
-----------------------------	----

外科重症监护病房老年患者呼吸机相关性肺炎 相关因素分析及防治

俞申燕 瞿昌晶 郭旋 朱锋

【摘要】 目的 了解外科重症监护病房(SICU)老年患者呼吸机相关性肺炎(VAP)的发生率、病死率、易感因素,指导 VAP 的临床防治。**方法** 对近 3 年内上海市杨浦区中心医院 65 例机械通气的老年患者进行回顾性分析。**结果** VAP 发生率为 66.2%,病死率为 67.4%,长时间机械通气及高 APACHE II 评分、低 GCS 评分和不恰当初始抗菌治疗等是 VAP 的易感因素。**结论** 在 SICU 病房,通过有效的防治措施,可降低老年患者 VAP 的发生率,提高治愈率。

【关键词】 肺炎,呼吸机相关性;外科重症监护病房;老年人

Related factors analysis and prevention of ventilator-associated pneumonia in surgical intensive care unit among elderly patient Yu Shenyan, Qu Changjing, Guo Xuan, Zhu Feng. Department of SICU, the Central Hospital of Yangpu District, Shanghai 200090, China

【Abstract】 Objective To understand the incidence, mortality and risk factors of ventilator-associated pneumonia(VAP) in surgical intensive care unit among elderly patient, in order to direct the clinical prevention and treatment of VAP. **Methods** Retrospective analysis was used on 65 cases of mechanical ventilation elderly patients in our hospital nearly 3 years. **Results** The incidence of VAP was 66.2%. The mortality of VAP was 67.4%. The factors of long-term mechanical ventilation, high APACHE II score, low Glasgow score and inappropriate initial antimicrobial therapy were influenced the prognosis of VAP. **Conclusion** The incidence of VAP can be decreased and the cure rate can be increased by some effective measures in SICU.

【Key words】 Pneumonia, ventilator-associated; Surgical intensive care unit; Aged

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.001

作者单位:200090 上海市,上海市杨浦区中心医院 SICU

乳腺疾病诊断中影像学检查的灵活应用

董 艳

【摘要】 目的 探讨乳腺影像学检查的优劣性和确诊率。**方法** 回顾性分析 2010 年 1 月至 2014 年 2 月手术的 389 例乳腺疾病患者资料,行彩超检查 389 例、乳腺 X 线摄影检查 325 例、MRI 检查 188 例、多层螺旋 CT(MSCT)检查 122 例。结合文献复习进行分析。**结果** 全组病例均行手术治疗、病理证实,其中 176 例为乳腺癌(浸润性导管癌 117 例,黏液腺癌 48 例,单纯癌 11 例),213 例为乳腺良性病变(纤维腺瘤 86 例,导管内乳头状瘤 35 例,脂肪瘤 14 例,非典型增生 26 例,囊性增生 34 例,平滑肌瘤 3 例,腺病 12 例,叶状肿瘤 2 例,炎症 1 例)。选择健侧的乳腺进行对比分析。彩超检查阳性发现率 91.0% (354 例/389 例),提示恶性病变率 75.0% (132 例/176 例);乳腺 X 线摄影检查阳性发现率 89.5% (291 例/325 例),提示恶性病变率 89.8% (158 例/176 例);MRI 检查阳性发现率 92.0% (173 例/188 例),提示恶性病变率 93.8% (165 例/176 例)、MSCT 阳性发现率 91.8% (112 例/122 例),提示恶性病变率 92.0% (162 例/176 例)。**结论** MRI、MSCT 在乳腺良恶性病变鉴别方面都具有较高的诊断价值;彩超、乳腺 X 线摄影、MRI、MSCT 在乳腺病变的阳性检出率差异不明显。

【关键词】 乳腺疾病;磁共振成像;乳房 X 线摄影术;体层摄影术,螺旋计算机;超声检查,乳房

The flexible application of image examination in diagnosis of breast diseases Dong Yan. Department of Image Function Examination, the Affiliated Hospital of Datong University, Datong, Shanxi 037005, China

【Abstract】 Objective To investigate the advantage and diagnosis rate of different image examination in breast diseases. **Methods** From January 2010 to February 2014, all image examination data of 389 breast disease patients who received surgical operation were collected and analyzed retrospectively. All patients underwent color Doppler ultrasound examination. Breast X-ray photographic examination was performed in 325 patients, and MRI examination in 188 patients, while 122 patients received MSCT examination. **Results** All surgical specimens were examined and diagnosed pathologically. Of all the patients, 176 patients were diagnosed with breast cancer (including 117 cases of infiltrating ductal carcinoma, 48 cases of mucinous carcinoma, and 11 cases of carcinoma simplex), 213 patients were confirmed as benign lesions (including 86 cases of adenomas, 35 cases of intraductal papilloma, 14 cases of lipoma, 26 cases of atypical hyperplasia, 34 cases of cystic hyperplasia, 3 cases of fibroids, 12 cases of adenomyosis, 2 cases of phyllodes tumor, and 1 cases with inflammation). The diagnosis rate with color Doppler ultrasound was 91.0% (354/389), and the results showed suggestive of malignancy was 75.0% (132/176 cases). The diagnosis rate with breast X-ray photographic examination was 89.5% (291/325 cases), and suggestive of malignancy rate was 89.8% (158/176). The diagnosis rate with MRI was 92.0% (173/188), suggestive of malignancy was 93.8% (165/176). The diagnosis rate with MSCT was 91.8% (112/122), while the suggestive of malignancy was 92.0% (162/176). **Conclusions** Both MRI and MSCT have a high diagnostic value than other image examination in discriminating benign and malignant breast diseases. However, there is no difference in diagnosis rate in breast diseases whenever color Doppler ultrasound, breast X-ray photographic examination, MRI or MSCT was used.

【Key words】 Breast diseases; Magnetic Resonance Imaging; Mammography; Tomography, Spiral Computed; Ultrasonography, Mammary

血脂康维持治疗老年人高脂血症的临床疗效观察

王 阳

【摘要】 **目的** 观察血脂康维持治疗老年人高脂血症的临床疗效。**方法** 选择老年高脂血症患者 96 例。按随机数字表法分为三组,对照组 1(32 例)服用瑞舒伐他汀 10 mg/次,1 次/d,睡前口服,疗程为 12 周;对照组 2(32 例)服用血脂康胶囊 0.6 g,2 次/d,睡前口服,疗程为 12 周。治疗组(32 例)患者首先服用瑞舒伐他汀 10 mg/次,1 次/d,睡前口服,使用 4 周,随后使用血脂康胶囊 0.6 g,2 次/d,共 6 周,整个疗程为 12 周。**结果** 三组治疗后,TC、TG、LDL-C 均显著下降,而 HDL-C 升高。而治疗组与对照组 1 疗效相似,差异无统计学意义($P > 0.05$)。**结论** 血脂康与瑞舒伐他汀 10 mg/次应用的降脂疗效相似,而血脂康性价比更占优势,可以大力推广使用。

【关键词】 高脂血症;血脂康;瑞舒伐他汀;老年人

Clinical efficacy of Xuezhikang maintenance treatment for senile hyperlipidemia Wang Yang. Department of the Traditional Chinese Medicine, Tongren Hospital of Shanghai Second Medical University, Shanghai 200336, China

【Abstract】 **Objective** To observe the clinical curative effect of Xuezhikang maintaining treatment for senile hyperlipidemia. **Methods** According to the digital table, 96 elderly patients with hyperlipidemia were selected and randomly divided into the three groups. The control group 1 with 32 cases took orally rosuvastatin before sleeping 10mg per time, 1 time/day, 12 weeks one treatment course. The control group 2 with 32 cases took orally Xuezhikang capsule before sleeping 0.6g 2 times/day, 12 weeks one treatment course. The treatment group with 32 cases took first orally rosuvastatin before sleeping 10 mg/time, 1 time/day for 4 weeks, then changed to use Xuezhikang capsule 0.6g 2 times/day for six weeks. The total treatment course was 12 weeks. **Results** After treatment, TC, TG, LDL-C in three groups all declined significantly and HDL-C increased. The curative effect was similar in treatment group and control group 1 with no statistical difference($P > 0.05$). **Conclusion** Xuezhikang has similar efficacy with rosuvastatin 10 mg/time in hyperlipidemia, and recommend Xuezhikang clinical use for its lower price.

【Key words】 Hyperlipidemias ; Xuezhikang; Rosuvastatin; Aged

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.003

作者单位:200336 上海市,上海交通大学医学院附属同仁医院中医科

团体催眠辅导对癌症患者焦虑和抑郁情绪的影响

蒋连英 邹佩 金福妹

【摘要】 目的 观察团体催眠辅导对癌症患者情绪的影响,探讨使癌症患者达到长期存活并拥有较高生活质量的有效措施。**方法** 将催眠治疗技术应用于团体辅导中,针对癌症患者的情绪状况设计团体辅导课程,并对辅导前后的焦虑自评量表(ASA)和抑郁自评量表(SDS)评分进行对比。**结果** 经过 20 次团体催眠辅导后,对 55 例癌症患者进行 ASA、SDS 测量,催眠辅导前 ASA(45.5 ± 6.2)分、SDS(47.3 ± 9.3)分,催眠辅导后 ASA(37.1 ± 3.3)分、SDS(38.2 ± 2.4)分,催眠辅导前后差异有统计学意义(ASA $P < 0.02$, SDS $P < 0.05$)。**结论** 团体催眠辅导能够明显改善癌症患者焦虑和抑郁情绪,催眠技术应用于癌症团体辅导非常实用、可行。

【关键词】 肿瘤;情绪障碍;催眠术;团体处理

Effect of team hypnotic counseling for cancer patients on anxiety and depression Jiang Lianying, Zou Pei, Jin Fumei. Department of Formation Division Qingpu Branch of Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 201700, China

【Abstract】 Objective To observe the effect of team hypnotic counseling for cancer patients on anxiety and depression, and to explore the effective measure to make cancer patients achieve long-term survival and quality of life. **Methods** The hypnotic treatment technology was carried in the application of team hypnotic counseling, and the emotional status was designed for cancer patients of team hypnotic counseling courses, and the self rating Anxiety Scale(ASA) and self rating Depression Scale(SDS) was contrasted before and after guidance. **Results** After 20 times of team hypnotic counseling, 55 cases of cancer patients were taken ASA, SDS measurement, before team hypnotic counseling, ASA was (45.5 ± 6.2) points, SDS was (47.3 ± 9.3) points, and after team hypnotic counseling, ASA was (37.1 ± 3.3) points, SDS was (38.2 ± 2.4) points, there was a significant difference before and after team hypnotic counseling(ASA $P < 0.02$, SDS $P < 0.05$). **Conclusion** The team hypnotic counseling can significantly improve cancer patients with anxiety and depression, application of hypnotic technique in cancer team counseling is very practical, feasible and worthy of further exploration.

【Key words】 Neoplasms; Mood disorders; Mesmerism; Group processes

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.004

作者单位:201700 上海市,复旦大学附属中山医院青浦分院信息科

阿糖腺苷联合干扰素 $\alpha 2b$ 雾化吸入治疗 小儿疱疹性咽峡炎 58 例疗效观察

李 会 邵媛媛 张 艳 胡秀娥

【摘要】 目的 观察阿糖腺苷联合干扰素 $\alpha 2b$ 雾化吸入治疗小儿疱疹性咽峡炎的临床疗效。**方法** 选取 2011 年 12 月至 2013 年 12 月诊治的小儿疱疹性咽峡炎患儿 58 例,按随机数字表法分为观察组和对照组各 29 例。所有患儿均予儿科护理常规及一般支持治疗,对照组以利巴韦林进行治疗,观察组采用阿糖腺苷联合干扰素 $\alpha 2b$ 雾化吸入进行治疗。观察记录治疗后的退热时间,疱疹消失时间、住院天数及不良反应情况,比较两组的疗效。**结果** 观察组退热时间、疱疹消失时间及住院天数均低于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。观察组治疗总有效率(96.6%)显著高于对照组(75.9%),差异有统计学意义($\chi^2 = 5.22, P < 0.05$)。两组均无明显不良反应。**结论** 阿糖腺苷联合干扰素 $\alpha 2b$ 雾化吸入治疗小儿疱疹性咽峡炎疗效好,安全性较高,未见不良反应,值得临床推广。

【关键词】 疱疹性咽峡炎;阿糖腺苷;干扰素 α ;投药,吸入

Observation of the curative effect of vidarabine and interferon α -2b aerosol inhalation in the treatment of 58 cases children with infantile herpangina Li Hui, Shao Yuanyuan, Zhang Yan, Hu Xiue. Department of Pediatrics, the Hospital of Shouxian County, Anhui 232200, China

【Abstract】 Objective To observed the clinical effect of vidarabine and interferon α -2b aerosol inhalation in the treatment of children with infantile herpangina. **Methods** 58 children with infantile herpangina were divided randomly into the observation group and control group, 29 cases in each group. All children were given the routine nursing and general supportive therapy. The patients in the control group were treated by ribavirin and those in the observation group treated by vidarabine and interferon aerosol inhalation. The fever clearance time, the disappearance time of herpes, the days of hospitalization and cases of adverse reaction was observed and recorded. **Results** The cooling time, bleb disappear time and hospital stay of the observation group were lower than those of the control group, the difference were statistically significant ($P < 0.05$). Comparison of the clinical effects of the two groups showed that the test group were significantly better than those in the control group ($P < 0.05$). The total effective rate in the observation group was 96.6%, which was higher than 75.9% in the control group ($\chi^2 = 5.22, P < 0.05$). No obvious adverse events took place in both groups. **Conclusion** Vidarabine and interferon aerosol inhalation in treating infantile herpangina takes a good effect, no obviously adverse reaction and is worth being widely applied in clinic.

【Key words】 Herpangina; Vidarabine; Interferon-alpha; Administration, Inhalation

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.005

作者单位:232200 安徽省寿县人民医院小儿科

两种方案用于肩关节镜术后镇痛效果比较

王 晶 李大鹏 李俊玲

【摘要】 目的 比较连续肌间沟臂丛神经阻滞与静脉自控镇痛用于肩关节镜手术术后镇痛的效果和不良反应。**方法** 选择 40 例 ASA 分级 I ~ II 级全身麻醉下行择期肩关节镜手术的患者,采用随机数字表法分为两组,每组 20 例。分别为连续肌间沟臂丛神经阻滞组(PCNA 组)和静脉自控镇痛组(PCA 组)。两组术后均接自控镇痛泵。PCNA 组采用 0.2% 罗哌卡因 + 0.9% 氯化钠注射液至 100 mL,背景参数为 4 mL/h,单次量 0.5 mL,锁时 20 min,术后 24 h 加药。PCA 组采用芬太尼 1 mg + 托烷司琼 5 mg + 0.9% 氯化钠注射液至 100 mL,背景参数为 2 mL/h,单次量 3.5 mL,锁时时间定为 20 min。记录比较手术结束后 6 h,12 h,24 h,48 h 患者 VAS 疼痛评分,以及术后头晕、恶心、呕吐及皮肤瘙痒等不良反应情况,48 h 后患者镇痛满意度调查。**结果** PCNA 组术后各时点 VAS 评分明显低于 PCA 组($P < 0.05$)。PCNA 组术后头晕、恶心、呕吐的发生率低于 PCA 组,差异有统计学意义($P < 0.05$)。PCNA 组的患者满意度为 100%,PCA 组的患者满意度为 75%,差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 连续肌间沟臂丛神经阻滞应用于肩关节镜手术术后镇痛的镇痛效果和患者满意度都优于静脉自控镇痛,且头晕、恶心、呕吐的发生率较低,可供临床使用。

【关键词】 镇痛,患者控制;关节镜检查;疼痛,手术后;臂丛;神经传导阻滞

Comparison of the effect of two prophylactic regimens for postoperative analgesia after shoulder arthroscopic surgery Wang Jing, Li Dapeng, Li Junling. Department of Anesthesiology, the 89th Hospital of Chinese People's Liberation Army, Weifang, Shandong 261021, China

【Abstract】 Objective To observed the analgesia and adverse reactions of continuous patients-controlled interscalene analgesia with patient-controlled intravenous analgesia for the shoulder arthroscopic surgery. **Methods** 40 patients with ASA I ~ II anesthesia in general anesthesia for the shoulder arthroscopic surgery were selected and randomly divided into the two groups, 20 cases in each group. They were continuous patients-controlled interscalene analgesia(PCNA) and patient-controlled intravenous analgesia (PCA). PCNA with 0.2% ropivacaine + saline to 100mL, background parameters 4ml/h, a single dose of 0.5mL, lock 20min. 24 hours after dosing. PCA with fentanyl 1mg + tropisetron 5mg + saline to 100mL, background parameters 2mL/h, a single dose of 3.5mL, lock 20min. Record the VAS score 6h, 12h, 24h, 48h after surgery, and adverse side effects of postoperative dizziness, nausea, vomiting and itchy skin. And the patient's analgesic satisfaction survey 48h after surgery. **Results** PCNA after surgery 6h, 12h, 24h, 48h in VAS score was significantly lower than the PCA ($P < 0.05$). PCNA were dizziness, nausea, vomiting and the incidence is lower than the PCA, the difference was statistically significant($P < 0.05$). The PCNA of patients satisfaction was 100%, the PCA of patients satisfaction is 75%, the difference was statistically significant($P < 0.05$). **Conclusion** In the postoperative analgesia of shoulder arthroscopic surgery, the analgesic effect and patient satisfaction of continuous patients-controlled interscalene analgesia are better than patient-controlled intravenous analgesia. And the dizziness, nausea, vomiting is lower.

【Key words】 Analgesia, Patient-Controlled; Arthroscopy; Brachial Plexus; Pain, Postoperative; Nerve Block

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.006

作者单位:261021 山东省潍坊,解放军第八十九医院麻醉科(王晶、李大鹏);
潍坊市人民医院麻醉科(李俊玲)

临终期肿瘤患者 120 例肺部感染病原菌分析

曾斌 景建军 尹挺立 张云江 李明

【摘要】 目的 对临终期肿瘤患者肺部感染行病原学分析。方法 对川北医学院附属三台县人民医院 2013 年 7 月至 2014 年 5 月间住院肺癌患者药物敏感性试验结果进行统计分析,并对其防治作初步探讨。**结果** 120 例患者合并肺部感染患者共培养致病菌 132 株,其中革兰阴性菌占 27.3%;革兰阳性菌占 59.8%;排在前 5 位的致病菌分别是链球菌、肺炎双球菌、葡萄球菌、白色念球菌、肺炎克雷伯菌,检出的细菌中对常用的抗生素存在不同程度的耐药性。**结论** 根据患者的病原学检测结果指导抗菌药物的选择和使用,提高抗菌药物的治疗有效性,减少细菌耐药性。

【关键词】 临终患者;临终医护;呼吸道感染;癌;微生物敏感性试验

Clinical study and analysis of pathogenic bacteria of pulmonary infection in patients with terminal cancer

Zeng Bin, Jing Jianjun, Yin Tingli, Zhang Yunjiang, Li Ming. Department of Oncology, the People's Hospital of Santai County, Affiliated to Chuanbei Medical College, Mianyang, Sichuan 621100, China

【Abstract】 **Objective** To analyze of pathogenic bacteria of pulmonary infection in patients with terminal cancer. **Methods** The clinical data were retrospectively analyzed including the general cultivation of pathogenic bacteria in sputum and the results of drug sensitivity of hospitalization of patients with lung cancer from July 2013 to May 2014. **Results** 132 strains of pathogenic bacteria were cultured from 120 cases of patients with pulmonary infection, including gram-negative bacilli accounted for the vast majority of 27.3%, accounted for 59.8% of Gram-positive cocci, Ranked in the top 5 pathogenic bacteria were Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, there are varying degrees of resistance to commonly used antibiotics in bacteria. **Conclusion** Selecting and using the antimicrobial agents according to the results of pathogen detection in patients, could improve the effectiveness of antibiotic treatment and reduce bacterial resistance.

【Key words】 Terminally ill; Terminal care; Respiratory tract infections; Carcinoma; Microbial sensitivity tests

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.007

作者单位:621100 四川省绵阳,川北医学院附属三台县人民医院肿瘤科

腹壁子宫内膜异位症 93 例彩色多普勒超声诊断分析

张淑琴

【摘要】 目的 总结腹壁子宫内膜异位症(AWE)的超声图像特征,探讨彩色多普勒超声在诊断 AWE 中的应用价值。**方法** 对 93 例经手术及病理确诊的 AWE 患者的超声诊断资料进行总结分析。**结果** 93 例均行手术切除,术后病理证实为 AWE,诊断符合率为 100%。93 例 AWE 患者均有产科或妇科手术史,大多数发生于剖宫产术后,彩色多普勒超声显示为腹壁切口周围不均质低回声包块,形态不规则,边界尚清,部分呈毛刺状向周围软组织、肌层及腹膜浸润;包块内部血流信号不丰富,部分内可见不规则的小液性区及强回声斑。**结论** 彩色多普勒超声不仅可以发现异位病灶,而且还能确定病灶的累及范围,是诊断 AWE 的一种简便、有效的检查方法,在临床上具有重要的应用价值。

【关键词】 子宫内膜异位症;超声检查,多普勒,彩色;腹壁

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.008

作者单位:048000 山西省晋城,晋城市人民医院超声医学科

高位气管切开术在急诊喉气管外伤的应用价值

徐松波 刘成珠 荣毅

【摘要】 目的 探讨高位气管切开术在急诊喉气管外伤治疗中的应用价值。**方法** 回顾性分析 35 例喉气管外伤患者的临床资料,其中开放性喉气管外伤 21 例,闭合性喉气管外伤 14 例。**结果** 21 例开放性喉气管外伤患者均行高位气管切开及喉腔探查,其中 19 例患者术后顺利拔管,2 例患者术后并发喉狭窄经支撑喉镜下瘢痕切除顺利拔管;14 例闭合性喉气管外伤中,3 例行高位气管切开及喉腔探查术,术后均成功拔管。**结论** 喉气管外伤的急诊处理中,应尽可能一期重建气管结构,尽快恢复喉组织结构的完整性,早期正确高位气管切开术可提高成功率,减少并发症。

【关键词】 颈部损伤;气管切开术;喉镜检查

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.009

作者单位:233000 安徽省蚌埠,蚌埠市第一人民医院耳鼻喉科

麝香保心丸联合比索洛尔治疗不稳定型心绞痛疗效探讨

于康宁 张秀芳

【摘要】 目的 观察麝香保心丸联合比索洛尔治疗冠心病不稳定型心绞痛的临床疗效,探讨药物联合治疗冠心病不稳定型心绞痛的临床最佳方案。**方法** 将 220 例符合纳入标准的不稳定型心绞痛患者按随机数字表法分为观察组和对照组,每组 110 例。两组均给予阿司匹林、他汀类药物等常规综合治疗。对照组给予比索洛尔治疗,观察组在对照组的基础上联合使用麝香保心丸,12 周后评价疗效。**结果** 观察组心绞痛症状改善效果的总有效率为 100.0% (110 /110),明显高于对照组的 74.5% (82 /110) ($P < 0.05$)。观察组心电图改善效果总有效率为 98.2% (108/110),明显高于对照组 75.5% (83/110) ($P < 0.05$)。**结论** 麝香保心丸联合比索洛尔治疗冠心病不稳定型心绞痛临床疗效显著,可以提高治疗有效率,减少心绞痛发作频率,并缩短发作持续时间,值得临床推广。

【关键词】 心绞痛,不稳定型;麝香保心丸;比索洛尔;治疗结果

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.010

作者单位:471003 河南省洛阳,中国空空导弹研究院洛阳二〇二医院内一科

鹿茸品种的性状鉴别分析

李楚芬 翁雪芬 朱志伟

【摘要】 **目的** 探讨中药材鹿茸的药用价值和真伪鉴别方法。**方法** 按随机数字表法选取 100 例购买鹿茸药材的群众,通过问卷调查的方法,了解群众购买药材的用途和药用价值。通过整理与鹿茸同名不同科属品种,从色泽、质地、气味、产地等四方面进行鉴别,为广大药学工作者提供鉴别方法。**结果** 通过整理鹿茸与其他同名不同科属品种的鉴别方法,有效降低了错误用药的发生率,药学工作者提高鉴别鹿茸同名异物现象后,错误用药发生率(14%)明显低于提高前(32%)(经双尾检验, $\chi^2 = 6.97, F = 1.80, t = 3.10, df = 198, P = 0.0022$)。**结论** 对鹿茸品种的性状鉴别分析可以帮助用药者提高鹿茸用药准确性,可有效避免鹿茸同名异物现象引发的错误用药。

【关键词】 鹿茸;药用价值;同名异物现象;真伪鉴别

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.011

作者单位:515000 广东省汕头,汕头大学医学院附属肿瘤医院药学部

妊娠合并急性阑尾炎 16 例临床分析

刘丽华 李梦思

【摘要】 目的 分析总结妊娠合并急性阑尾炎的临床特点,为临床确定有效的治疗方案及减少对母婴危害提供依据。**方法** 对收治的妊娠合并急性阑尾炎患者进行临床分析,年龄 22~35 岁,孕 1~3 次,手术孕周为 12~26 周,平均 16 周。发病时间为 48 h 内。阑尾炎的类型为单纯性阑尾炎 9 例,化脓性阑尾炎 5 例,穿孔性阑尾炎 2 例。16 例患者均以局麻、小切口、皮内缝合开腹手术治疗。**结果** 完成妊娠中期合并急性阑尾炎阑尾切除术 16 例。16 例患者术中、术后均无并发症发生,且均妊娠至足月分娩,新生儿出生体质量和 Apgar 评分未发现异常。**结论** 妊娠合并急性阑尾炎是妊娠期最常见的急腹症,早期诊断和及时手术治疗是良好预后的关键,应引起产科工作者的重视。

【关键词】 妊娠并发症;阑尾炎;阑尾切除术

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.012

作者单位:072150 河北省满城县医院妇产科

声信息治疗耳鸣 40 例临床分析

罗世柏 周雅丽 罗艳红

【摘要】 目的 观察声信息治疗耳鸣的临床疗效。**方法** 选择 80 例耳鸣患者,随机分为两组,观察组 40 例,50 耳,采用声信息治疗的基础上配合药物改善微循环、营养耳神经等治疗;对照组 40 例,52 耳,采用常规改善微循环、营养耳神经等处理。治疗时间均为 10 d。记录比较两组患者治疗前、后的耳鸣程度及疗效。**结果** 观察组对耳鸣的疗效为显效 15 例,有效 11 例;与对照组(8 例,16 例)相比较,均差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 利用声信息治疗耳鸣患者疗效值得肯定。

【关键词】 耳鸣;声信息治疗;银杏叶提取物;倍他司汀;盐酸氟桂利嗪

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.013

作者单位:418008 湖南省怀化,解放军第五三五医院耳鼻喉科

中国 30 年眼睑炎与睑腺炎的防治 Meta 分析

梁韶春 王 娜 梁丽丽 侯国娜

【摘要】 **目的** 总结近 30 年眼睑炎与睑腺炎发病及防治经验。**方法** 收集近 30 年关于眼睑炎及睑腺炎病因及防治随机对照研究 (PCT) 文章。由两位作者独立评价文献,进行 Meta 分析。**结果** 眼睑炎与睑腺炎 60% 金黄色葡萄球菌引起 [$OR = 1.76, 95\% CI(1.05 \sim 2.95)$], 中医治疗优于传统抗生素 [$OR = 0.45, 95\% CI(0.30 \sim 0.68)$]。**结论** 结论葡萄球菌疫苗可防止眼睑炎及睑腺炎的发生。改变生活方式和合理治疗可防止复发。

【关键词】 眼睑炎; 睑腺炎; Meta 分析

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.014

作者单位:250022 山东省济南,济南市第五人民医院内一科

闭合复位股骨近端抗旋转髓内针治疗 老年人股骨粗隆间骨折 38 例

杨庆森 白振国

【摘要】 目的 探讨研究股骨近端抗旋转髓内针(PFNA)治疗老年患者股骨粗隆间骨折临床疗效。
方法 回顾分析 38 例 60 ~ 93 岁股骨粗隆间骨折患者,采用闭合复位 PFNA 内固定技术治疗的临床资料。
结果 38 例患者中,37 例均获随访。PFNA 内固定患者的手术时间短,出血量少,住院时间及骨折愈合时间缩短,髋关节评分标准功能评分优 24 例,良 12,差 1 例,优良率 97.3%。髋关节功能恢复满意。**结论** 应用 PFNA 治疗老年患者股骨粗隆间骨折疗效满意,是目前治疗老年人股骨粗隆间骨折较为理想的治疗方法。

【关键词】 股骨骨折;骨折固定术,髓内;老年人

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.015

作者单位:030800 山西省晋中,晋中市第二人民医院骨科

胰岛素泵在糖尿病患者围手术期的临床应用

万云波 李峥峻

【摘要】 目的 探讨胰岛素泵在围手术期的临床使用。**方法** 48 例拟行手术治疗血糖控制差的糖尿病患者按随机数字表法分组,26 例给予每天多次皮下胰岛素注射(MISS 组),22 例给予胰岛素泵连续皮下胰岛素输注(CSII 组)治疗,观察两组血糖达标时间,胰岛素用量,低血糖发生率,伤口愈合延迟发生率。**结果** CSII 组比较 MISS 组胰岛素使用量明显减少 $[(38.12 \pm 7.15) \text{U/d}$ 比 $(49.35 \pm 7.48) \text{U/d}$, $P < 0.01$],血糖达标时间明显缩短 $[(4.56 \pm 2.35) \text{d}$ 比 $(8.42 \pm 3.42) \text{d}$, $P < 0.01$],低血糖发生率(9% 比 31%)及伤口愈合延迟发生率(0.0% 比 7.7%)明显减少。**结论** CSII 在围手术期治疗中各方面均优于 MISS。CSII 在糖尿病患者围手术期可做为优先选择。

【关键词】 胰岛素输注系统;糖尿病,2 型;围手术期医护

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.016

作者单位:441400 湖北省宜城,宜城市人民医院内分泌科

美托洛尔联合坎地沙坦治疗充血性心力衰竭 62 例疗效观察

王官凤 刘士兰 许 诺

【摘要】 目的 观察美托洛尔联合坎地沙坦治疗充血性心力衰竭(CHF)的疗效。**方法** 将 122 例 CHF 患者按入院先后顺序随机分为观察组(62 例)和对照组(60 例)。观察组在美托洛尔基础上加用坎地沙坦,疗程为 6 个月。分别于用药前及用药后 6 个月测定左心室射血分数(LVEF)及左室短轴缩短率(FS)。**结果** 观察组总有效率 93.54%,对照组总有效率 69.99%,两组总有效率比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。LVEF 显著增加($P < 0.05$),FS 显著减少($P < 0.01$)。**结论** 美托洛尔联合坎地沙坦治疗充血性心力衰竭疗效显著。

【关键词】 心力衰竭;充血性;美托洛尔;坎地沙坦

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.017

作者单位:610501 四川省成都,成都市新都区第二人民医院内一科(王官凤、许诺);
安徽省淮南东方医院集团总院(刘士兰)

女性冠心病患者心电图表现与冠状动脉病变的相关性

魏力华

【摘要】 目的 探讨女性冠心病患者的心电图及冠脉病变特点。**方法** 采用前瞻性病例对照研究,对 350 例临床诊断为冠心病和疑为冠心病女性患者的心电图及冠脉造影果进行分析,并与同期检查的男性患者 510 例对比。**结果** 女性心电图阳性率高(74.2%),男性阳性率低(54.1%);女性 T 波改变(45.5%)明显高于男性(31.9%);女性冠脉造影阳性率低(47.1%),男性冠脉造影阳性率高(68.9);两者差异有统计学意义($P < 0.05$)。女性冠脉病变以单支病变为主,其次为三支、双支病变,病变部位以左前降支为主,其次为左回旋支、右冠脉、左主干。冠脉重度狭窄明显低于男性($P < 0.05$)。**结论** 女性心电图阳性率高,T 波改变多见;冠脉造影阳性率低,冠脉病变受累支数低于男性,重度狭窄明显低于男性($P < 0.05$)。冠脉造影对女性冠心病的诊断有重要价值,但亦可能造成女性冠心病漏诊。

【关键词】 冠状动脉疾病;冠状血管造影术;心电图记录术;女性

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.018

作者单位:550014 贵州省贵阳,贵阳医学院附属白云医院心内科

导管接触溶栓治疗下肢深静脉血栓 50 例 临床疗效分析

张金柱 张 丽

【摘要】 目的 探讨导管接触溶栓治疗在急性下肢深静脉血栓的安全性及有效性。**方法** 50 例急性下肢深静脉血栓形成患者,经腘静脉置入溶栓导管直接插入静脉血栓,持续泵入尿激酶进行溶栓。治疗过程中及结束时,通过静脉造影及 Duplex 检查判断静脉通畅情况评价疗效及静脉瓣膜功能,并于出院半年后随访。

结果 50 例患者溶栓后静脉造影复查显示,治愈 15 例(30%),显效 30 例(60%),有效 5 例(10%);治疗过程中未出现严重并发症。45 例患者取得随访,随访时间 6~18(10.5 ± 6.1)个月,5 例未能得到随访。静脉造影或 Duplex 检查,40 例深静脉瓣膜得以保存,深静脉瓣膜保存率达 80%。**结论** 急性下肢深静脉血栓形成腔内导管接触溶栓治疗,是一种安全有效的治疗方法。

【关键词】 静脉血栓形成;导管插入术,外周;机械溶栓;尿激酶型纤溶酶原激活物

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.019

作者单位:015000 内蒙古自治区巴彦淖尔,巴彦淖尔市医院血管外科

腹腔镜与小切口手术治疗急性结石嵌顿性 胆囊炎疗效分析

杨新安

【摘要】 目的 总结急性结石嵌顿性胆囊炎腹腔镜下行胆囊切除术(LC)比小切口胆囊切除术(MC)的优势和效果。**方法** 回顾分析 150 例急性结石嵌顿性胆囊炎手术的临床资料,2011 年 11 月以前为 MC,以后 LC,各 75 例,比较两组手术时间、胃肠功能恢复时间及进食时间、术后止痛剂使用情况、切口感染,切口疝、粘连性肠梗阻等并发症,住院时间等指标。**结果** 两组手术均顺利完成,无死亡、无胆瘘和胆管损伤。腹腔镜组无中转开腹。LC 组手术时间短[(58.4 ± 8.06) min 比(79.4 ± 3.5) min, $t = -36.911, P = 0.002$],肠功能恢复早,进食早[(22.5 ± 2.8) h 比(47.4 ± 6.0) h, $t = -31.526, P = 0.000$],住院时间短[(3.8 ± 1.5) d 比(7.1 ± 3.2) d; ($t = 9.881; P = 0.000$)]]; LC 组术后镇痛剂使用率低[4.0% (3/75) 比 MC 组 21.3% (16/75) ($\chi^2 = 10.944, P = 0.001$)]];并发症少,LC 组;1 例剑突下戳孔处红肿。MC 组;3 例切口感染,2 例粘连性肠梗阻,1 例切口疝。**结论** 急性结石嵌顿性胆囊炎 LC 手术比 MC 手术更具微创优势,在基层医院可大力推广。

【关键词】 胆囊炎,急性;腹腔镜胆囊切除术

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.020

作者单位:471700 河南省洛宁县人民医院普外科

一起由埃可病毒 30 型所致脑炎暴发疫情调查

王增良 尹保行 倪丽丽 李 芳

2013 年 5 月至 7 月,山西省临汾市蒲县部分小学、幼儿园陆续出现发热、头痛、呕吐为主要症状的患儿,临床诊断为

病毒性脑炎。经流行病学调查分析,这是一起由埃可病毒 30 型引起的病毒性脑炎区域流行,现报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.021

作者单位:041000 山西省临汾,临汾市疾病预防控制中心检验科

小切口顶泌汗腺清除术治疗 2 100 侧腋臭分析

刘雄彪 汪晓红

腋臭又称“狐臭”，是由于腋窝顶泌汗腺分泌的不饱和脂肪酸被细菌分解而形成的特殊臭味。该病治疗方法较多，如药物外涂、药物局部注射、激光治疗、手术治疗等，目前大家公认的是小切口顶泌汗腺清除术效果最佳。笔者 2005 年

1 月至 2013 年 12 月对 1 051 例患者 2 100 侧腋臭行小切口顶泌汗腺清除术，现就手术方法及术后常见的并发症、预防及处理方法报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.022

作者单位:431700 湖北省天门,天门市第一人民医院皮肤科

单纯疱疹 A16 病毒 VPI 序列变异与小儿 中枢神经系统损伤的关系

赵娟 赵霞 汪宏 陈宗波

单纯疱疹病毒(HSV)为有包膜的 DNA 病毒,单纯疱疹病毒在全球广泛分布,人类是唯一的宿主^[1]。感染主要通过人群与易感者之间的密切接触,无季节差异。HSV-1 最常感染的部位为口腔和唇,但也可侵犯任何器官。HSV 通过嗅神经和三叉神经进入嗅球和三叉神经半月节,或潜伏在嗅球和三叉神经半月节的 HSV 再次被激活,结果 HSV-1 导致靠近嗅球的额叶底部和靠近三叉神经半月节的额颞底部首先被 HSV 侵入而发生病变,如病情严重者可侵犯全脑。这也说明为什么 HSV 脑炎患者在发病早期容易首先出现精神和智力障碍症状,以及在影像上常提示额、颞叶有异常改变。肉眼观,受损脑以额叶、颞叶和边缘叶为主,但严重者呈全脑弥漫

性损害。病变部位的表面脑回变厚,脑沟变狭,脑膜发紧,可见充血和渗出,甚至坏死软化,且这种改变为不对称性;切面上还可见灶性或片状出血。严重者可见额叶和颞叶出现大片出血性坏死。在镜下,可见脑膜和脑组织内的血管周围有大量淋巴细胞形成袖套状浸润,小胶质细胞明显增生,而神经细胞广泛变性和坏死,并可见出血灶。在病变区域的神经细胞和胶质细胞内可发现嗜酸性包涵体,此为疱疹病毒的颗粒和抗原。本研究旨在初步观察 2012 年 5 月至 12 月住院的 21 例单纯疱疹 A16 病毒性脑炎和脑膜炎患儿脑脊液标本中病毒 VPI 段基因序列变异及氨基酸位点突变与中枢神经系统损害的关系。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.023

作者单位:266300 山东省胶州,胶州市人民医院儿科(赵娟、汪宏);
胶州市中心医院(赵霞);青岛大学医学院附属医院儿科(陈宗波)

自拟小儿肺炎汤颗粒剂配合针刺疗法 治疗小儿支气管肺炎 32 例

李冬梅

笔者 1990 年师从张永华老师学习,时至冬日,小儿肺炎甚多,张老师多用中医治疗,效果很好,毕业后从事临床工作,在张老师治疗肺炎方的基础上加减成“小儿肺炎汤颗

粒”,治疗小儿支气管肺炎 32 例,效果相当满意,现报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.024

作者单位:037003 山西省大同,大同矿区新平旺社区卫生服务中心

京万红软膏治愈阴囊湿疹并感染四例

盛彦峰 李敬宽 刘 芳

老年男性大都有前列腺增生,出现尿频、尿急、尿不尽的症状,经常导致尿湿衣裤,被褥,再加上清洗更换不及时,会引起阴囊湿疹等皮肤病变^[1-2],经搔抓后出现皮肤破溃、渗

出,甚至感染。尤其是活动不便,长期卧床的老年人为甚。我们对 4 例这样的老年人,涂抹京万红软膏治疗均治疗痊愈。现分析报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.025

作者单位:063000 河北省唐山,河北省军区唐山干休所卫生所门诊部

老年高血压患者社区保健供求分析

王晓晴 于晓雯 管阳太

高血压是多发病、常见病,同时也是脑中风、冠心病的危险因素^[1]。可以说高血压是严重威胁着人类健康的“无声杀手”,这已经成为世界性的主要公共卫生问题,极大地危害老年患者的健康。但大医院医疗资源缺乏,从而在敦促老年

患者有效的控制血压、坚持长期服用降压药中,社区医院起着关键作用^[2]。老年高血压患者因年龄和病种的关系,对地段医院的服务有其特殊的需求,笔者就其服务需求及社区医院所能提供的实际服务进行分析。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.026

基金项目:上海申康医院慢性病综合防治项目脑卒中高危人群个体筛查与干预管理方案研究基金(SHDC12012314)资助项目

作者单位:200433 上海市,第二军医大学附属长海医院神经内科

通信作者:管阳太,Email:yangtaiguan@126.com

上门随访对喉癌术后保留气管套管出院患者的影响

杨红珍 王前英

【摘要】 目的 探讨上门随访对喉癌术后保留气管套管出院患者生活质量的影响。**方法** 采用问卷对 15 例出院且愿意配合的喉癌术后保留气管套管患者进行上门随访的健康教育。严格筛选随访人员,注意随访前的准备,随访时间,联系方式,技巧以及在随访中实施健康指导与监控等。**结果** 随访后患者的生活质量显著改善。生活质量评分由 3~4 分均提高到 5 分。**结论** 上门随访可以提高喉癌术后保留气管套管患者出院后的生活质量。

【关键词】 喉切除术;气管切开术;健康教育;随访研究

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.027

作者单位:436099 湖北省鄂州,鄂州市中心医院耳鼻喉科

《药讯》在基层医院临床药学工作开展中的作用

徐洪亮 张雅奇

【摘要】 目的 探讨目前环境与条件下基层医院药学人员开展临床药学工作的突破口。**方法** 采用回顾性调查方法,按照国家卫计委抗菌药物临床应用监测网处方抽样方法,从通城县人民医院 HIS 系统中抽取 2010-2014 年度的普通门诊、住院处方中固定数量的处方,统计出处方合格率、抗菌药物使用率、联用率、围术期预防性应用及抗菌药物使用强度 (AUD) 值,并对统计结果进行分析。**结果** 处方合格率由 63% 上升至 91%,门诊部抗菌药物使用率由 86% 降至 33%,住院部抗菌药物使用率由 77% 降至 58%,抗菌药物联用率由 63% 降至 7%,合理术前预防用药率由 12% 上升至 97%,I 类切口应用率由 100% 降至约 48%,AUD 值由 112.6 降至 58.4。**结论** 利用《药讯》这一医药交流重要信息平台,可提升临床对药学工作的认可度,推动基层医院临床药学工作的开展,从而促进合理用药。

【关键词】 药学服务;药物信息机构;处方不当;药讯

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.028

作者单位:437400 湖北省通城县人民医院药剂科

与社区卫生服务相结合的社区康复模式

胡东侠 李东梅

社区康复是 1976 年由 WHO 提出的一种经济有效、覆盖面广、在家庭和社区层次上为残疾人提供康复服务的新途径。我国于 1986 年正式开展社区康复的研究和实践。经过十多年的试点、总结和推广,已经形成了集组织管理、技术指导 and 训练服务为一体的社区康复体系,通过实施国家康复计划,已使 500 多万残疾人得到了不同程度的康复。为了充分

利用社区卫生资源,进一步扩大社区康复服务的覆盖面,提高社区康复服务的效果、效率和效益,根据中共中央、国务院关于“积极开展社区卫生服务”的决定和第 14 次全国残联工作会议的精神,开展与社区卫生服务相结合的社区康复模式研究十分必要。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.029

作者单位:232007 安徽省淮南,淮南东方医院集团望机医院

PDA 移动护理系统在儿科优质护理中的应用

叶亚娜 顾军养

【摘要】 目的 探论 PDA 移动护理系统在儿科优质护理的效果。**方法** 运用 PDA 移动护理系统对患儿进行信息采集、医嘱执行、移动查房、患者安全管理、护理文书的结构化、健康宣教模块化等一系列的流程开展临床护理工作。采用回顾性的分析比较开展前后护理工作差错事件及患儿家长对护理工作的满意度调查。**结果** 开展前后患儿家长对护理工作的满意度分别为 74.0%、92.0%，差异有统计学意义($\chi^2 = 17.05, P < 0.01$)。**结论** PDA 移动护理系统能有效降低护理差错事件的发生,提高护理服务质量和患儿家长的满意度,促进优质护理更好的发展。

【关键词】 护理;计算机,掌上;信息系统;患者满意度

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.030

作者单位:316000 浙江省舟山,舟山市妇幼保健院外科

全程优质护理在全喉切除围手术期中的应用

王前英 杨红珍

【摘要】 目的 探讨全程优质护理在全喉切除术围手术期的应用及效果。**方法** 选取湖北省鄂州市中心医院 2009 年 1 月至 2013 年 7 月确诊为喉癌晚期的男患者 60 例。年龄 50 ~ 70 岁,平均 62.5 岁。观察组 (31 例)对照组 (29 例),在围手术期对照组应用常规护理,观察组在此基础上应用全程优质护理措施,比较两组患者进行医疗护理时的依从性,患者及亲属的满意度,住院期间未发生感染的情况以及术后患者焦虑抑郁自评情况。**结果** 观察组护理效果优于对照组,而护理依从性、患者满意度高于对照组,医院感染率低于对照组,患者定期进行 zung's 自评量表,焦虑抑郁者明显低于对照组,差异有统计学意义。**结论** 全程优质护理可提高全喉切除患者在围手术期的治疗效果,提高患者及亲属对医疗护理的依从性,增加患者及亲属的满意度,降低住院感染,促进患者身体及心理健康的恢复。

【关键词】 喉肿瘤;喉切除术;围手术期护理

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.031

作者单位:436099 湖北省鄂州,鄂州市中心医院耳鼻喉科

高龄患者无痛胃镜检查术后的复苏护理

王洁琼

【摘要】 目的 总结高龄患者无痛胃镜检查术后的复苏护理经验。**方法** 318 例高龄患者无痛胃镜检查护理重点是患者入复苏室前备好抢救物品、药品及设备;患者入复苏室后注意保暖,严密监测生命体征及氧饱和度,加强呼吸道护理,对出现的并发症及时对症处理,患者清醒后进行良好的护患沟通,严格掌握离院标准,以保证患者安全。**结果** 318 例患者麻醉复苏时间 0.5 ~ 1.5 h,平均 1 h,复苏期出现并发症 21 例,其中呼吸道梗阻 4 例,低血压 5 例,低氧血症 9 例,低体温 3 例,经对症治疗后好转。**结论** 复苏护理使胃镜检查成功率及患者满意度均得到提高。

【关键词】 胃镜检查;麻醉和镇痛;复苏术;护理;老年人

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.032

作者单位:316000 浙江省舟山,舟山市中医骨伤联合医院门急诊部

紫杉醇致急性血压升高一例观察与护理

严培芳

随着人们生活节奏的加快,卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官常见的恶性肿瘤之一,早期卵巢癌的特异性症状较少,早期筛查作用有限,因此在发病早期诊断出的概率较低,在就诊时,60%~70%的患者已发展为晚期,疗效不佳^[1]。因此,卵巢癌发病率仅次于宫颈癌和子宫体癌^[2],但卵巢上皮癌病死率却占各类妇科肿瘤的首位,对妇女生命形成严重威

胁,发病率呈逐年上升趋势。紫杉醇联合顺铂方案为晚期卵巢癌一线治疗的标准方案,但其毒副反应不容忽视,特别是急性血压升高,若处理不当可致死亡。2014年8月我科收治1例紫杉醇致血压升高的患者,经积极救治、精心护理,病情好转出院,现报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.033

作者单位:436000 湖北省鄂州,鄂州市中心医院肿瘤科

硫糖铝口服混悬液治疗急性放射性食管炎的观察与护理

章 艳 方伟虹

食管癌是我国常见的恶性肿瘤之一,对中晚期患者临床上采用的主要治疗方法是放射性治疗,但是放射性作用会对食管组织造成损伤,引起放射性食管炎的发生,严重影响治疗效果^[1-3]。放射性食管炎多在放疗 2 周左右出现,主要是放射线对食管黏膜的损伤,使之产生充血、水肿、溃疡、糜烂。

其主要症状为进食时吞咽疼痛,食管烧灼感,胸骨后疼痛,进行性加重^[4],给患者带来很大痛苦,甚至影响治疗进程,打击患者治疗信心。我科对食管癌放疗期间引起的放射性食管炎采用硫糖铝口服混悬液(迪先)含服取得了一定的效果。现将护理体会报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.034

作者单位:310022 浙江省杭州,浙江省肿瘤医院新 16 病房

重症海蜇蜇伤 56 例的救治护理

许雪琴 王 兵 杨 卉

海蜇蜇伤致海蜇皮炎,少数会出现严重并发症甚至发生死亡。现将本院 2011-2014 年(6~9 月份)对在山东半岛东

北部沿海段海上游泳发生 56 例重症海蜇蜇伤患者救治护理情况报告如下。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.035

作者单位:264200 山东省威海,解放军第四〇四医院骨科

通信作者:王兵,Email:w bwh404@163.com

妊娠合并肥厚型心肌病一例

梁媚珍 江均贤 姚剑锋

女, 29 岁, 因“停经 38⁺⁵ 周, 咳嗽咳痰 1 周, 腹阵痛 55 min”于 2013 年 12 月 11 日入住东莞市石碣医院。患者平素月经规律, 末次月经 20130313, 预产期 20131220, 停经后无明显恶心、呕吐等早孕反应。孕 4⁺ 月开始自觉胎动持续良好, 孕期不规则产检, 未发现特殊; 否认孕期有放射线接触史及服药史; 孕期无头晕、眼花、头痛、胸闷、气促等不适。1 周前无诱因出现咳嗽, 咳白色黏痰, 无咽痛、发热、鼻塞流涕等, 在社区门诊拟“急性支气管炎”中药治疗 3 d, 症状稍好转。55 min 前出现下腹痛阵痛, 无阴道流血、流液, 来院就诊, 拟“孕足月临产、支气管炎”收入院。既往无高血压、心脏病、糖尿病、结核等病史。孕 2 产 1, 2004 年 6 月顺产一男婴。入院查体: 生命体征正常, 咽部充血, 扁桃体无肿大, 双肺呼吸音粗, 未闻及啰音, 心律齐, 轻度收缩期杂音。妊娠腹形, 宫高 30 cm, 腹围 100 cm, 胎方位 LOA, 头先露, 已衔接, 胎心率 132 次/min, 宫缩 35 s/2 ~ 3 min, 阴查: 宫口开大 10 cm, 先露棘下 3 cm, 胎膜未破, 骨盆测量无异常。初步诊断: 孕 2 产 1 孕 38⁺⁵ 周 LOA 临产; 急性支气管炎。入院后立

即上台接生, 2 min 后阴道分娩一足月活女婴, 体质量 2.98 kg, 胎盘胎膜自娩完整, 宫颈及会阴裂伤予以缝合, 共失血 100 mL, 术后予缩宫素、美洛西林钠治疗, 输液 700 mL。分娩后患者频繁咳嗽, 伴咳痰、胸闷, 稍气促, 无心悸、呼吸困难, 心电图无心律失常; 胸片提示: 拟左下肺感染; 心脏呈烧瓶状向两侧扩大; 心房脑钠素 BNP 1 320 μg/L, 拟“围产期心肌病、心功能不全、肺部感染”转内科治疗。转入后心脏彩超示: 室间隔与左室后壁不均匀增厚, 厚度之比 ≥ 1.3, 心包积液(中-重度), 左房稍大, 二尖瓣轻度反流, 左室收缩功能正常、舒张功能减低, EF80%; 血常规 WBC 15.9 × 10⁹/L, NO. 79, 支原体(-), 24 h 尿蛋白 156.9 mg, 血总蛋白 60 g/L, 白蛋白 30.8 g/L, 球蛋白 29.2 g/L, 心肌酶、电解质、肾功能、免疫 8 项未见异常。最后诊断为: (1) 肥厚型心肌病、心包积液、心功能 III 级; (2) 左下肺炎; (3) 孕 2 产 2 孕 38⁺⁵ 周 LOA 顺产; (4) 单胎足月活女婴。经过抗感染、利尿、改善心功能、营养心肌等治疗后, 患者咳嗽咳痰症状明显缓解, 复查彩超、胸片提示心包积液减少。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.036

作者单位: 523290 广东省东莞, 东莞市石碣医院产科(梁媚珍), 内科(江均贤、姚剑锋)

彩色多普勒超声诊断颈动脉-海绵窦瘘二例

敬思猛

例 1, 女性, 21 岁。因左眼外部伤后复视、眼球凸出 1 个月入院。眼科检查: 右眼正常, 视力 1.0。左眼视力 0.8 矫正无增强, 眼压 25.8 mmHg。左眼眼睑肿胀明显, 眼球向正前方凸出, 外展不能; 结膜血管迂曲怒张, 无水肿; 角膜透明, 前房深度正常, 房水清晰, 玻璃体未见混浊, 眼底正常。院外 CT 检查示球后占位性病变, 本院 CT 检查示左侧海绵窦异

常。临床诊断: 海绵窦综合征(左)。彩色多普勒超声检查(探头频率 7.5 MHz)示: 双眼轴长均为 22 mm 右眼未见异常。左眼球后三角区沿视神经内侧可见一扩张的血管(眼上静脉), 内经 8 mm, 其内为红蓝相间的彩色血流, 流速较快, 脉冲多普勒取样为连续的紊乱血流频谱。彩色多普勒超声诊断: 左侧颈动脉-海绵窦瘘。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2014.s2.037

作者单位: 735000 甘肃省酒泉, 解放军第二十五医院特诊科