

中国基层医药[®]

CHINESE JOURNAL OF PRIMARY MEDICINE AND PHARMACY

半月刊 1994年7月创刊 第22卷 增刊1 2015年6月30日出版

主管
中华人民共和国国家卫生和
计划生育委员会

主办
中华医学会
100710,北京市东四西大街42号

安徽医科大学
230032,安徽省合肥市梅山路81号

编辑
中国基层医药编辑委员会
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6664827
(0554)6665318
Email:cjpmvip@163.com
http://www.cjpm.com

总编辑
吴孟超 郑芙林

编辑部主任
黄政

出版
中国基层医药杂志社
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6665318,6664827
Email:cjpmvip@163.com

广告经营许可证号
3404000000009

印刷
蚌埠光大彩色制印有限公司

发行
范围:公开
国内:北京报刊发行局
国外:中国国际图书贸易集团
有限公司
(北京399信箱,100044)
代号M4777

订购
全国各地邮政局
邮发代号 82-948

邮购
中国基层医药杂志社
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号
电话(传真):(0554)6665318,6664827
Email:cjpmvip@163.com

定价
每期10.00元,全年240.00元

中国标准连续出版物号
ISSN 1008-6706
CN 34-1190/R

增刊1 备案号:341190201502

2015年版权归中华医学会所有

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,可向中国基层医药杂志社出版发行部调换

目次

论著

- 不同剂量地佐辛单独应用于剖宫产术后
硬膜外镇痛的效果比较 1
刘心国 宿世玉 李佳慧
- N-乙酰半胱氨酸防治放射性肺损伤疗效观察 3
谢军 汤俊 杨振 刑应如 石明宏 朱铭
- 腹腔镜下囊肿去顶减压术治疗多囊肾的
临床疗效评价 7
牛新民 邵晨 岳忠 詹斌雄
- 化脓性眼内炎259例致病菌分析 11
张云琴 康玉国 刘秋妮
- 肿瘤患者导管相关性血流感染监测分析 14
李文英 贾守月
- 低分子肝素治疗妊娠晚期羊水过少的
临床疗效及对患者凝血功能的影响 16
杜淑丽
- 经肋膈隐窝入路胸膜间阻滞治疗
功能性消化不良92例 18
高拥权 贾和平
- 抗高血压药物不良反应118例报告 21
顾春妹 邱佳萍
- 慢性心力衰竭合并胸腔积液108例临床分析 23
钱晋 晋玉梅 方芳
- 氟哌噻吨美利曲辛治疗慢性萎缩性胃炎
并抑郁患者疗效分析 25
时荣海 郑曦
- 腹腔镜下直肠癌根治术48例临床分析 27
朱家明 郭云虎 韩爱民
- 2010-2014年长丰县性病监测报告分析 29
陶敏
- 高血压患者心脑血管并发症140例分析 31
袁鸿燕
- 复方酮康唑乳膏联用玉屏风颗粒
降低外耳湿疹复发率 32
秦小玲
- 输卵管结扎术920例手术分析 34
余琳 柏杨

静脉滴注复方甘草酸苷治疗特应性皮炎 31 例临床观察	36
郑子义 胡晋华 赵海生 李静 史瑞英	
痰热清联合左氧氟沙星治疗老年人肺炎疗效观察	38
李卫红	
研究与实践	
头孢哌酮舒巴坦不良反应 139 例分析	40
徐珏华 王晓珉 朱迪 徐华 张武标	
如何降低基层医院剖宫产率	42
姜琪	
无创通气与有创通气在晚期弥漫间质性肺病患者的应用比较	43
刘新桥 靳凯 梁春芳 马伟松 王伟	
病例报告	
甲状腺鳞癌合并多发性肌炎一例	45
康晓菲 焦月江 汪增方	
腰椎间盘突出症合并范科尼综合征一例	46
陈支国 谢曲 徐芳 胡蓉 彭维涛 李磊 王文虎	
菊池病一例	47
彭中辉 程伟	
乳腺癌化疗后合并间歇性完全性左束支阻滞一例	48
柏杨 朱铭	
卫生管理	
地市级医院基本公共卫生服务区乡联动模式探讨	49
范志红 韩志祥 艾方红	
医院的导医工作	51
苟小婕	
结合“军卫一号”信息管理系统开发药品管理系统的设计与应用	53
沈静萍 单磊敬 于晓波	
护理学	
浅述临床输血护理风险的防范	55
罗惠如	
预冲式冲管注射器盒的多种巧用	57
王前英 陈先梅	
优质护理在脑血栓患者护理中的应用	58
黎娜	
“百针计划”加一对一带教模式在低年资护士培训中的应用和效果观察	59
黄亚玲 陈秀红 彭小兰	
读者·作者·编者	
《中国基层医药》杂志 2015 年下半年增刊征文通知	44
《中国基层医药》杂志校对注意事项	48
《中国基层医药》杂志关于书写论文作者单位名称的要求	56

中华医学会系列杂志一览表	对正文
---------------------------	-----

不同剂量地佐辛单独应用于剖宫产术后硬膜外镇痛的效果比较

刘心国 宿世玉 李佳慧

【摘要】 目的 研究不同剂量地佐辛单独应用于剖宫产术后硬膜外镇痛的效果、单次硬膜外镇痛最佳剂量及不良反应。**方法** 将 120 例 ASA 分级 I ~ II 级的剖宫产患者按随机数字表法随机分为四组:地佐辛 1 组(2.5 mg, D1 组)、地佐辛 2 组(5 mg, D2 组)、地佐辛 3 组(10 mg, D3 组), 对照组吗啡组(2 mg, M 组); 分别于硬膜外腔注射相应剂量的镇痛药物稀释液行术后镇痛。观察记录术后 4 h、8 h、12 h、24 h 患者疼痛 VAS 评分、恶心呕吐、皮肤瘙痒等不良反应的发生及患者的镇痛满意度。**结果** D1 组在 4 h、8 h、12 h 时点 VAS 评分与 D2 组、D3 组、M 组均差异有统计学意义($P < 0.05$); 术后 4 h、12 h 时点, D2 组、D3 组和 M 组 VAS 评分均差异无统计学意义($P > 0.05$); 术后 8 h 时点, D3 组与 D2 组、M 组比较差异有统计学意义($P < 0.05$); 在术后 24 h 时点 4 组比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。D1、D2、D3 组不良反应较 M 组更少, 其中 D2 组患者满意度更高。**结论** 硬膜外用适当剂量的地佐辛用于剖宫产术后的镇痛能够取得较为理想的镇痛效果, 且不良反应更少, 患者满意度更高。

【关键词】 麻醉, 硬膜外; 镇痛, 产科; 地佐辛; 吗啡; 剖宫产术

Comparison of the effect of different concentrations of dezocine for postoperative epidural analgesia after cesarean section Xinguo Liu, Shiyu Su, Jiahui Li. Department of Anesthesiology, the Fifth People's Hospital of Jinan, Jinan, Shandong 250022, China

【Abstract】 Objective To compare the clinical effect and adverse reactions of different concentrations of dezocine epidural anesthesia for cesarean section. **Methods** According to digital table, 120 cases of elective cesarean section were randomly divided into 4 groups with 30 cases in each group, the group D1 was given with dezocine 2.5mg, the group D2 with dezocine 5mg, the group D3 with dezocine 10mg, the group M with morphine 2mg. All the drugs used in postoperative epidural analgesia after cesarean section. To observe resting pain and conduct the VAS scoring at postoperative 4, 8, 12, 24h and record various adverse reactions. **Results** The VAS scores at postoperative 4, 8, 12h in the group D1 were lower than those in the D2, D3, M with statistical difference (all $P < 0.05$). The VAS scores at postoperative 4, 24h had no statistical difference among D2, D3, M groups (all $P > 0.05$). The VAS scores at postoperative 8h in the group D3 were lower than those in the D2, D3, M with statistical difference (all $P < 0.05$). There were no statistical differences among 4 groups at postoperative 24h (all $P > 0.05$). The incidence rates of nausea and vomiting the group M were higher than that in the group D1, D2 and D3, showing statistical difference among them ($P < 0.05$). **Conclusion** Appropriate concentrations of dezocine used in postoperative epidural analgesia after cesarean section has definite effect and less adverse reactions

【Key words】 Anesthesia, Epidural anesthesia; Analgesia, obstetrical; Dezocine; Morphine morphine; Cesarean section

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.001

基金项目:山东省济南市卫生局科技计划项目(2013-07)

作者单位:250022 山东省济南, 济南市第五人民医院麻醉科

N-乙酰半胱氨酸防治放射性肺损伤疗效观察

谢军 汤俊 杨振 刑应如 石明宏 朱铭

【摘要】 目的 观察胸部肿瘤放射治疗期间应用 N-乙酰半胱氨酸(NAC)对放射性肺损伤的保护作用。**方法** 86 例胸部肿瘤患者接受常规放射放疗,随机分成两组,设放疗 + N-乙酰半胱氨酸组(RT + N)和单纯放疗组(RT),两组通过胸部 CT 进行放疗后观察,严重程度按 RTOG 放射性肺炎分级标准进行观察,放疗前和放疗 4 周后每 2 周观测血浆转化生长因子(TGF- β 1),白介素 1(IL-1)、白介素 4(IL-4)、肿瘤坏死因子(TNF)指标,在放疗 8 周结束后终止观察。**结果** 86 例患者放疗 3 个月,RT + N 组放射性肺炎 ≥ 2 级者占 23.3% 而 RT 组 ≥ 2 级者占 53.5%。RT + N 组放射性肺炎发生率低于 RT 组,两组差异有统计学意义($P < 0.01$);6、9、12 个月时,肺纤维化的发生率(RT + N)组为 28.4%、25.4%、22.4%;RT 组分别为 58.4%、54.4%、52.4%,两组比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。TGF- β 1、IL-1、IL-4、TNF 水平,在放疗期间及 8 周后,RT 组明显高于 RT + N 组。**结论** N-乙酰半胱氨酸在胸部肿瘤患者放射治疗时能够减少急慢性放射性肺损伤的发生率,同时也能降低 TGF- β 1、IL-1、IL-4、TNF 的含量与表达。

【关键词】 放射性肺炎;乙酰半胱氨酸;转化生长因子 β 1;白细胞介素类;肿瘤坏死因子类

Observation of the protective effect of N-NAC on radiation-induced pulmonary injury Xie Jun, Tang Jun, Yang Zhen, Xing Yingru, Shi Minghong, Zhu Ming. Department of The Center of Lung Cancer, Huainan Dongfang Cancer Hospital, Huainan, Anhui 232035, China

【Abstract】 Objective To observe the protective effect of N-NAC on radiation-induced lung injury.

Methods 86 cases of thoracic neoplasm patients were chosen and randomly divided into two groups, group RT + N ($n = 43$) and group RT ($n = 43$). Two groups were observed by CT after radiotherapy. Acute and chronic toxicities were graded by RTOG. TGF- β 1, IL-1, IL-4, TNF were observed before and after the radiotherapy. **Results** After 3 months of radiotherapy, RTOG ≥ 2 was 23.4% (RT + N), while RTOG ≥ 2 was 53.1% (RT). there was significant difference between the two groups ($P < 0.01$). At 6, 9 and 12 months, fibrosis was present in 28.4%, 25.4%, 22.4% receiving RT vs 58.4%, 54.4%, 52.4% receiving RT + N, there was significant difference between the two groups ($P < 0.05$). TGF- β 1, IL-1, IL-4, TNF were observed which showed that The RT + N were lower than RT. **Conclusion** N-NAC can reduce incidence rate of lung injury in radiotherapy, and can reduce the content and the release of TGF- β 1, IL-1, IL-4, TNF

【Key words】 Radiation pneumonitis; Acetylcysteine; Transforming growth factor betal; Interleukins; Tumor necrosis factors

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.002

基金项目:安徽省淮南市科技计划资助项目(2011A07602)

作者单位:232035 安徽省淮南,淮南东方肿瘤医院肺癌诊治中心

腹腔镜下囊肿去顶减压术治疗多囊肾的临床疗效评价

牛新民 邵晨 岳忠 詹虢雄

【摘要】 目的 比较腹腔镜肾囊肿去顶减压术和开放肾囊肿去顶减压术两种手术方式治疗多囊肾的临床疗效。方法 对 108 例多囊肾患者的临床资料进行回顾性分析,其中腹腔镜手术 60 例,开放手术 48 例,对两组手术时间、术中出血量、术后引流量、术后肠道功能恢复时间、术后住院天数、并发症发生率、肾功能情况、血压情况和临床疗效等指标进行比较。结果 腹腔镜组手术时间为(57.7 ± 13.2) min,术中出血量为(35.9 ± 17.3) mL,术后排气时间为(1.6 ± 0.7) d,术后引流量为(23.2 ± 4.3) mL,术后住院天数为(5.1 ± 0.8) d,均显著少于开放手术组;腹腔镜组出现 3 例皮下气肿、腹膜后血肿及尿瘘并发症,并发症发生率为 5.0%,开放手术组出现 8 例腹膜后血肿、切口感染、尿瘘并发症,并发症发生率为 16.7%,两组间并发症差异有统计学意义($P < 0.05$)。腹腔镜组和开放手术组患者术后 3 月时肌酐、尿素氮水平及收缩压水平均较术前显著下降,两组之间差异无统计学意义($P > 0.05$)。开放手术组 48 例中治愈率和有效率分别为 81.2% 和 18.8%,腹腔镜组治愈率和有效率分别为 85.0% 和 15.0%,两组疗效差异无统计学意义($P > 0.05$)。结论 腹腔镜下囊肿去顶减压术在手术时间、术中失血量、并发症、术后恢复情况方面均优于开放手术,具有疗效可靠,损伤小,恢复快等优点,可以作为治疗多囊肾的首选方式。

【关键词】 多囊肾,常染色体显性;腹腔镜检查;减压术,外科

Clinical study of laparoscopic renal cyst decortication in polycystic kidney Niu Xinmin, Shao Chen, Yue Zhong, Zhan Xiaoxiong. Department of Urology, Xijing Hospital of Fourth Military Medical University, Xi'an, Shanxi, 710032, China

【Abstract】 Objective To evaluate the clinical value of laparoscopic renal cyst decortication and open cyst decortication surgery in the treatment of polycystic kidney disease. **Methods** Various clinical parameters were retrospectively analyzed in 108 patients with polycystic kidney, include laparoscopic 60 cases and open surgery 48 cases. The observation indexes include operative time, operative bleeding, restoration time of bowel functions, postoperative drainage volume, hospital time, postoperative complications, kidney function, blood pressure, and the clinical effects were estimated. **Results** In the laparoscopic group, the average operation time was (57.7 ± 13.2) min, the average blood was (35.9 ± 17.3) mL, the average time of exsufflation was (1.6 ± 0.7) d, the average postoperative drainage volume was (23.2 ± 4.3) mL, the average hospital time was (5.1 ± 0.8) d. As compared with the open surgery group, the operation time, hospital stay, operative bleeding, postoperative drainage and hospital time of the laparoscopic group shortened significantly (all $P < 0.05$). The complication rate of the laparoscopic group and open surgery group were 5.0% and 16.7% separately. The complication incidence was significantly lower in the laparoscopic group than that in the open surgery group ($P < 0.05$). At 3 months postoperative, the levels of serum creatinine (Cr), urea nitrogen (UN) and systolic blood pressure were obviously decreased compared with preoperative. There were no significant difference between the two groups ($P > 0.05$). The follow-up data showed that the cure rate and effective rate of the open surgery group were 81.2% and 18.8%, and the cure rate and effective rate of the laparoscopic group were 85.0% and 15.0% respectively. There were no significant difference of the clinical effects between the two groups ($P > 0.05$). **Conclusion** The laparoscopic was superior to the open surgery in the operation time, hospital time, operative bleeding, postoperative drainage and hospital time. Laparoscopic renal cyst decortication in polycystic kidney is open surgery safer, little injury, quick recovery. Laparoscopic renal cyst decortication is safe and effective therapy, which can be used as primary surgical treatment for patients with polycystic kidney.

【Key words】 Polycystic Kidney, Autosomal Dominant; laparoscope; Decompression, Surgical

化脓性眼内炎 259 例致病菌分析

张云琴 康玉国 刘秋妮

【摘要】 **目的** 分析化脓性眼内炎的病原菌分布特点及其药物敏感性,为临床选择有效的抗菌药物提供有价值的信息。**方法** 对 259 例眼内炎患者采集前房液或玻璃体液进行病原菌培养和药物敏感试验并对结果进行分析。**结果** 259 例标本中,细菌培养阳性标本 113 例,检出率为 43.63%,共培养出 120 株病原菌,革兰阳性球菌 89 株,占 74.17%,革兰阳性杆菌 11 株,占 9.17%,革兰阴性杆菌 13 株,占 10.83%,革兰阴性球菌 5 株,占 4.17%,真菌 2 株,占 1.67%。**结论** 化脓性眼内炎主要致病菌是以革兰阳性球菌为主,应及时监测病原菌种类分布和药敏变化,合理使用抗生素,减少耐药菌株的产生。

【关键词】 眼内炎;眼感染,细菌性;纸片扩散抗菌试验;纸片扩散抗菌试验

Pathogenic organisms analysis of 259 cases of suppurative endophthalmitis Zhang Yunqin, Kang Yuguo, Liu Qiuni. Shanxi Provincial Eye Hospital, Taiyuan, Shanxi 030002, China

【Abstract】 Objective To analyze the pathogens of suppurative endophthalmitis, their distribution and drug susceptibility. Provide valuable information for the clinical options in effective use of antimicrobial agents. **Methods** Collected 259 cases of endophthalmitis from the patients with aqueous humor and vitreous fluid for pathogens and drug sensitivity test in order to carry on the analysis of the results. **Results** 113 cases of bacterial culture positive in 259 cases of specimens, with a detection rate of 43.63%. 6 cases of multiple bacteria infection, and 2 case of fungal infection. The total separation of pathogens was 120 strains. 89 strains were gram positive coccus, accounting for 74.17%, 11 were gram positive bacillus strains, accounting for 9.17%, 13 strains of gram-negative bacilli, accounted for 10.83%, gram-negative in 5 strains (4.17%), fungus in 2 strains (1.67%). **Conclusion** Main pathogenic bacteria suppurative endophthalmitis is gram-positive, the pathogen species distribution and antimicrobial susceptibility of change should be timely monitored and the rational using of antibiotics can reduce the generation of drug-resistant strains.

【Key words】 Endophthalmitis; Eye infections, bacterial; Disk diffusion antimicrobial tests

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.004

作者单位:030002 山西省太原,山西省眼科医院检验科

肿瘤患者导管相关性血流感染监测分析

李文英 贾守月

【摘要】 目的 探讨肿瘤患者中心静脉导管相关性血流感染(CRBSI)相关危险因素监测的临床指导价值及护理干预结果。**方法** 通过对肿瘤患者中心静脉置管和维护过程中的手卫生、无菌技术及 CRBSI 感染率进行监测,分析感染率变化的危险因素,制定实施有效的护理干预措施。**结果** CRBSI 感染率从 2013 年 7 月 9.31%下降至 2013 年 9-10 月为 0。**结论** 监测有利于及时发现有关 CRBSI 感染危险因素,而给予相应的护理干预,可有效控制并降低 CRBSI 感染率。

【关键词】 导管相关性感染;肿瘤;住院病人;护理干预

Monitoring and analysis of catheter related bloodstream infection in tumor patients Li Wenyong, Jia Shouyue.
Department of Management Infection, Tumor Hospital of Datong Coal Mine Group Co. Ltd, Datong, Shanxi 037003, China

【Abstract】 Objective To study the tumor patients with central venous catheter related bloodstream infection (CRBSI) risk factors related to monitoring the clinical guidance value and nursing intervention results. **Methods** Through to the cancer center venipuncture and maintain hand hygiene, aseptic technique and in the process of CRBSI infection monitoring, analysis of risk factors for infection rates change, effective nursing intervention measures for implementation. **Results** CRBSI infection rate was down from 9.31% in July 2013 to 0 in september and October 2013. **Conclusion** Process and results of monitoring is conducive to timely find CRBSI infection risk factors give corresponding nursing intervention, control and reduce CRBSI rates.

【Key words】 Tumor; Catheter-related infections; Neoplasms; Inpatients; Nursing intervention

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.005

作者单位:037003 山西省大同,大同煤矿集团公司肿瘤医院院感科

低分子肝素治疗妊娠晚期羊水过少的临床疗效及对患者凝血功能的影响

杜淑丽

【摘要】 目的 探讨低分子肝素治疗妊娠晚期羊水过少的临床疗效及对孕妇凝血功能的影响。**方法** 收集 100 例妊娠晚期羊水过少患者,按照随机数字表法分为观察组以及对照组,对照组进行常规治疗,观察组患者在常规治疗基础上使用低分子肝素治疗。**结果** 观察组患者的临床疗效评分(8.52 ± 1.48)分,明显高于对照组患者的疗效评分(5.03 ± 1.26)分,差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 对于妊娠晚期羊水过少患者而言在临床上使用低分子肝素能够显著提升患者的治疗效果,在临床上可以进行推广使用。

【关键词】 肝素,低分子;羊水过少;血液凝固

Clinical effect of the low molecular heparin in the treatment of oligohydramnios in late pregnancy and its influence on pregnant women blood coagulation function Du Shuli. Department of Obstetrics, the People's Hospital of Leling, Leling, Shandong 253600, China

【Abstract】 Objective To investigate the clinical effect of the low molecular heparin in the treatment of oligohydramnios in late pregnancy and its influence on pregnant women blood coagulation function. **Methods** According to didital table 100 patients with oligohydramnios in late pregnancy were divided into the observation group and control group. The treatment group was given routine treatment, and the observation group was given low molecular heparin therapy on the basis of conventional treatment. **Results** The clinical curative effect score of the observation group was (8.52 ± 1.48) points, which was obviously higher than (5.03 ± 1.26) points of the control group, the difference was statistically significant ($P < 0.05$). **Conclusion** For patients with oligohydramnios in late pregnancy, low molecular heparin can be a significant boost for the clinical treatment effect of patients, can promote the use in clinic.

【Key words】 Heparin, Low-Molecular-Weight; Oligohydramnios; Blood Coagulation

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.006

作者单位:253600 山东省乐陵,乐陵市人民医院产科

经肋膈隐窝入路胸膜间阻滞治疗 功能性消化不良 92 例

高拥权 贾和平

【摘要】 目的 探讨经肋膈隐窝入路胸膜间阻滞治疗功能性消化不良(FD)的可行性。**方法** FD患者92例,分三个亚型即:餐后不适综合征(PDS 28例)、上腹痛综合征(EPS 28例)和PDS重叠EPS(36例)。分亚型按随机数字表法分为两组:治疗组和对照组,对照组给予帕罗西汀、甲氧氯普胺、奥美拉唑,8周/1个疗程;治疗组在对照组基础上行经肋膈隐窝入路胸膜间阻滞;以20 mL注射器针头于患侧腋中线第9肋上缘穿刺进针,以阻力消失证实达肋膈隐窝,即胸膜腔最宽处,注射消炎镇痛液,1周1次,4次1个疗程。于治疗前、治疗后1周和6个月分别对患者行VAS评分、餐后不适程度、精神症状评分疗效评价。**结果** 两组治疗后患者疼痛均明显减轻,餐后不适、焦虑或抑郁症状显著改善,VAS及SCL-90明显下降,两组VAS治疗前分别为(7.66±1.14)分、(7.57±1.18)分,治疗后为(1.13±0.33)分、(3.22±0.66)分;两组SCL-90治疗前(173.56±10.21)分、(174.50±11.18)分,治疗后(106.52±9.91)分、(106.38±10.12)分,均差异有统计学意义($P < 0.05$),但以治疗组疗效更著,且疗效持续时间更长($P < 0.05$)。**结论** 经肋膈隐窝入路胸膜间阻滞治疗FD操作简便易行,安全有效,门诊可实施。

【关键词】 消化不良;神经传导阻滞;胸膜腔;膈

Interpleural block via costodiaphragmatic recesses in the treatment of 92 patients with functional dyspepsia

Gao Yongquan, Jia Heping. Department of Internal Medicine, the Sitaizui Central Township Hospital of Chongli County, Hebei 076350, China

Corresponding author: Jia Heping, Email: 13833308817@163.com

【Abstract】 Objective To explore feasibility of interpleural block via costodiaphragmatic recesses for treating functional dyspepsia (FD). **Methods** 88 FD patients including three subtype: postprandial distress syndrome (PDS 24 cases), epigastric pain syndrome (EPS 28 cases) and PDS overlapping EPS (36 cases) were divided into two groups randomly according to FD subtype: treatment group and control group. The control group were treated with paroxetine, metoclopramide and omeprazole, PO, 8 weeks per course of treatment; The treatment group were treated by interpleural blocks via costodiaphragmatic recesses (CDR) on the basis of treatment of control group, sterile syringe needles of 20 mL were inserted vertically by the methods of resistance losing into CDR, the widest position of interpleural space through superior borders of the ninth ribs of the affected sides in midaxillary lines. Weekly injections of 20 mL of anti-phlogistic and analgetic solution were given over a four-week period. VAS, SCL-90 and degree of postprandial distress were evaluated before treatment, at 1 week and 6 months after treatment. **Results** The patients of the two groups achieved pain, depression and anxiety and postprandial distress relief obviously after treatment, VAS and SCL-90 decreased significantly. Before the treatment, the VAS scores of the two group were (7.66±1.14) points, (7.57±1.18) points, respectively, which after the treatment were (1.13±0.33) points, (3.22±0.66) points; Before the treatment, the SCL-90 scores of the two group were (173.56±10.21) points, (174.50±11.18) points, respectively, which after the treatment were (106.52±9.91) points, (106.38±10.12) points. There were statistically significant differences between pretreatment and posttreatment in the two groups (all $P < 0.05$), and the treatment group was better and lasted longer than that of control group (all $P < 0.05$). **Conclusion** Interpleural block via CDRs for treating FD is a feasible, simple, safe, effective approach and can be provided on an outpatient basis.

【Key words】 Dyspepsia; Nerve Block; Pleural Cavity; Diaphragm

抗高血压药物不良反应 118 例报告

顾春妹 邱佳萍

【摘要】 目的 总结分析抗高血压药物不良反应,探讨基层高血压管理中的要求,以提高患者的治疗依从性。**方法** 回顾性总结 118 例高血压药物不良反应患者临床资料,将有关数据进行分类统计分析。**结果** 118 例患者中,男性 43 例,占 36.4%;女性 75 例,占 63.6%;女性多于男性,比例为 1 : 1.74;其中 50 ~ 69 岁的患者明显多于其他年龄段,占 62.2%;药物不良的发生率以钙离子拮抗剂(CCB)为主,占 54.1%;其次为血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)占 21.2%,ACEI 占 13.6%,复方制剂占 9.3%,利尿剂占 0.9%, β 受体阻滞剂占 0.9%;临床主要的不良反应为下肢水肿、面部潮红、头痛、乏力、咳嗽等症状。**结论** 高血压的患病率女性高于男性,50 ~ 69 岁患者高于其他年龄段;抗高血压药物的不良反应与患者的性别、年龄、药物种类有关,在抗高血压治疗时应合理选用。

【关键词】 抗高血压药;药物副反应报告系统;药物毒性

Clinical analysis of 118 cases adverse reactions of anti-hypertension drug Gu Chunmei, Qiu Jiaping. Department of Internal Medicine, Nanqiao Town Community Health Service Center of Fengxian District, Shanghai 201499, China

【Abstract】 Objective To discuss the significance of the hypertension management in root level communities and improve patients' treatment compliance and therapeutic effects by summarizing and analyzing adverse reactions caused by antihypertensive drugs. **Methods** Retrospectively summarize clinical data of 118 hypertension patients and statistically analyzed relevant data in a classified manner. **Results** 43 cases of 118 patients were male, accounting for 36.4%, and 75 cases were female accounting for 63.6%. Female patients were more than male patients and the ratio of male patients to female ones is 1 : 1.74. Patients from 50 to 69 years old were significantly more than those of other ages and account for 62.2%. The incidence rates of adverse reactions caused by calcium channel blockers(CCB), Angiotensin II receptor antagonist(ARB), ACEI, compound preparation, diuretic and beta receptor blockers are 54.1%, 21.2%, 13.6%, 9.3%, 0.9% and 0.9%. Main clinical adverse reactions were edema of lower extremity, flush, headache, lack of power, cough, etc. **Conclusion** The prevalence of the hypertension in females is higher than that in males, the prevalence of the hypertension in patients from 50 to 69 is higher than that in patients of other ages, adverse reactions caused by antihypertensive drugs are associated with the gender and age of the patients and variety of the drugs and such drugs should be selected on a reasonable basis during hypertension treatment.

【Key words】 Antihypertensive Agents; Adverse Drug Reaction Reporting Systems; Drug Toxicity

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.008

作者单位:201499 上海市,上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心内科

慢性心力衰竭合并胸腔积液 108 例 临床分析

钱晋 晋玉梅 方芳

【摘要】 **目的** 探讨慢性心力衰竭合并胸腔积液患者的临床特点,积累经验,避免误诊。**方法** 回顾性分析 108 例慢性心力衰竭合并胸腔积液患者的临床及实验室资料。**结果** 108 例患者中以双侧胸腔积液为多,单侧胸腔积液以右侧为多。大多为中等量或少量积液,大量积液少见,胸腔积液与心力衰竭的程度相关。108 例患者中初诊误诊 23 例,误诊率为 21.3%。**结论** 慢性心力衰竭常伴有胸腔积液,有时临床并不典型,容易引起误诊,需加强鉴别诊断。

【关键词】 心力衰竭;胸腔积液;病理状态,体征和症状

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.009

作者单位:201415 上海市,上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心(钱晋);上海市奉贤区中医医院(晋玉梅、方芳)

氟哌噻吨美利曲辛治疗慢性萎缩性胃炎 并抑郁患者疗效分析

时荣海 郑曦

【摘要】 目的 观察应用黛力新治疗慢性萎缩性胃炎合并抑郁患者的效果。方法 慢性萎缩性胃炎合并抑郁患者 70 例采用随机数字表法分组,对照组给予一般的胃黏膜保护、抗幽门螺旋杆菌及一般对症治疗,观察组在对照组的基础上加用黛力新(氟哌噻吨美利曲辛片),早晚服用各 10 mg,治疗 4 周。结果 两组患者的腹胀、反酸和食欲不振等症状好转情况的差异有统计学意义($P < 0.05$)。GDS 量表评估观察组治疗前平均得分为 17.74 分,治疗后平均 11.31 分,差异有统计学意义($P < 0.05$)。对照组治疗前后的平均分分别为 17.34 和 15.09 分,差异无统计学意义($P > 0.05$)。观察组与对照组总体抑郁的缓解情况差异有统计学意义($\chi^2 = 11.497, P < 0.05$)。结论 老年 CAG 患者应注重抑郁与焦虑的评估,适时选择抗抑郁药物黛力新联合联合消化药物治疗对于慢性萎缩性胃炎合并抑郁患者可明显减轻消化道症状、减少抑郁的发生率。

【关键词】 胃炎,萎缩性;氟哌噻吨美利曲辛;抑郁

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.010

作者单位:100091 北京市,解放军国防大学门诊部保健科(时荣海);北京老年医院消化科(郑曦)

通信作者:郑曦,Email:zhengxi091@163.com

腹腔镜下直肠癌根治术 48 例临床分析

朱家明 郭云虎 韩爱民

【摘要】 目的 探讨腹腔镜下的直肠癌根治术的临床效果。**方法** 选取 48 例采用腹腔镜下的直肠癌根治术治疗的患者和 49 例采用传统开腹手术治疗的患者。将两组患者的临床疗效进行比较分析。**结果** 腹腔镜下的直肠癌根治术总有效率为 95.83%，传统开腹手术总有效率为 81.63%，腹腔镜下的直肠癌根治术优于传统开腹手术，差异有统计学意义($\chi^2 = 10.0821, P = 0.0015$)；在手术时间、手术的出血量、住院时间以及术后并发症发生情况均优于传统开腹手术。**结论** 腹腔镜下直肠癌根治术具有操作安全、创伤小、疗效好、恢复快、术后并发少的优点，应在临床上广泛应用。

【关键词】 直肠肿瘤；腹腔镜检查；直肠结肠切除术，重建性

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.011

作者单位:223300 江苏省淮安,淮安市淮阴医院肛肠科

2010-2014 年长丰县性病监测报告分析

陶敏

【摘要】 **目的** 监测某县域内性病发病率及发病变化趋势,提出有效控制发病的建议、措施。**方法** 把国家传染病报告信息管理系统中 2010-2014 年五年期间报告的艾滋病、淋病、梅毒的数据导出,运用 Excel 的统计分析功能,进行地区、人群、职业的三间分布分析。**结果** 县城所在地和南部乡镇中的民工、家务待业与商业服务与是性病的高发地区和高发人群。**结论** 某县 2010-2014 年五年期间性病发病呈上升趋势,相关部门针对重点地区的重点人群采取有效措施控制发病率。

【关键词】 性传播疾病;人群监测;一级预防

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.012

作者单位:231100 安徽省长丰县疾病预防控制中心疾控科

高血压患者心脑血管并发症 140 例分析

袁鸿燕

【摘要】 **目的** 分析社区高血压患者发生心脑血管疾病的危险因素,探讨基层医疗社区健康干预的必要性。**方法** 回顾性分析 2009 年 1 月至 2015 年 1 月期间 140 例因心脑血管疾病住院的高血压患者的临床资料。**结果** 高血压患者发生心脑血管疾病与患病时间,服药时间,服药方式,情绪因素,生活习惯,饮食习惯等相关。**结论** 降压药物治疗是减少心脑血管疾病发生的主要手段,社区综合干预是减少高血压患者心脑血管疾病并发症必不可少的重要方法。

【关键词】 高血压;心脑血管疾病;综合干预

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.013

作者单位:430070 湖北省武汉,武汉市洪山区中医医院内科

复方酮康唑乳膏联用玉屏风颗粒 降低外耳湿疹复发率

秦小玲

【摘要】 目的 探讨应用复方酮康唑乳膏治疗外耳湿疹时,口服中药玉屏风颗粒是否可以降低外耳湿疹的复发率。**方法** 106 例外耳湿疹采用随机数字表法分两组各 53 例,对照组先用 3% 过氧化氢溶液清洗皮损,再涂以复方酮康唑乳膏,3 次/d;治疗组在上述治疗基础上,口服玉屏风颗粒,每次 5 g,3 次/d,两组共治疗 2 周。随访 6 个月,统计两组复发病例,比较其复发率。**结果** 复方酮康唑乳膏治疗外耳湿疹 100% 有效,治疗两周,患者耳部发痒、渗液症状消失,皮损消退。6 个月后随访,对照组复发率 13.2% (7/53);治疗组复发率 1.9% (1/53)。两组比较差异有统计学意义 ($P=0.025$)。**结论** 复方酮康唑乳膏联用玉屏风颗粒治疗外耳湿疹,可显著降低外耳湿疹复发率。

【关键词】 湿疹;酮康唑;玉屏风散;外耳

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.014

作者单位:200120 上海市,上海市浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心

输卵管结扎术 920 例手术分析

余琳 柏杨

【摘要】 目的 探讨输卵管结扎术并发症、手术意外、后遗症、术中不良反应的成因、预防及处理。**方法** 回顾分析输卵管结扎术 920 例术后并发症、手术意外、后遗症、术中不良反应的临床特点、成因及防治措施。**结果** 有术后并发症或手术意外、术中不良反应计 70 例,除 6 例后遗症(结扎未遂)术后改用补救措施即上环避孕外,余均对症处理而得到妥善处置。**结论** 严格掌握适应证,严格遵守手术操作规程、针对性开展术前心理咨询和指导、医患密切合作,是减少术中不良反应、预防各种并发症最有效的方法,对全面提高节育手术质量具有非常重要的临床意义。

【关键词】 绝育,输卵管;手术中并发症;手术后并发症

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.015

作者单位:232082 安徽省淮南,淮南市潘集区计划生育服务站妇产科(余琳);淮南东方肿瘤医院心电图室(柏杨)

静脉滴注复方甘草酸苷治疗特应性皮炎 31 例 临床观察

郑子义 胡晋华 赵海生 李静 史瑞英

【摘要】 目的 观察应用静脉滴注复方甘草酸苷治疗特应性皮炎效果。**方法** 特应性皮炎 58 例采用随机数字表法分组,治疗组静脉滴注复方甘草酸苷、口服盐酸西替利嗪片及外用药物治疗;对照组口服盐酸西替利嗪片及外用药物治疗。**结果** 治疗组 31 例患者中,治愈 19 例,总有效率 93.55%,对照组 27 例患者中,治愈 4 例,有效率 55.56%,治疗组治愈率达 61.29%,治疗组治愈率和有效率显著高于对照组($P < 0.01$)。**结论** 应用复方甘草酸苷静脉滴注治疗特应性皮炎,尤其青年及成人期患者,不失为一种有效方法。

【关键词】 皮炎,特应性;复方甘草酸苷;治疗结果

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.016

作者单位:045000 山西省阳泉,阳煤集团总医院皮肤性病科

痰热清联合左氧氟沙星治疗老年人肺炎疗效观察

李卫红

【摘要】 目的 观察痰热清注射液联合左氧氟沙星治疗老年人肺炎的疗效。**方法** 78 例老年人肺炎患者按随机数字表法分为两组,治疗组 39 例,对照组 39 例,两组病例在对症支持治疗的基础上均给予左氧氟沙星 200 mL 静脉滴注,1 次/d。治疗组:加用痰热清注射液 20 mL 静脉滴注,1 次/d;对照组:加服祛痰灵 20 mL,3 次/d。10 d 为 1 个疗程,两组病例均治疗 1 个疗程。**结果** 治疗组:显效 16 例、有效 18 例、无效 5 例,总有效率为 87.2%;对照组:显效 11 例、有效 14 例、无效 14 例,总有效率为 64.1%,两组疗效差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 痰热清注射液联合左氧氟沙星治疗老年人肺炎安全有效。

【关键词】 肺炎;痰热清注射液;氧氟沙星;老年人

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.017

作者单位:201415 上海市,上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心内科

头孢哌酮舒巴坦不良反应 139 例分析

徐珏华 王晓珉 朱迪 徐华 张武标

【摘要】 目的 了解头孢哌酮舒巴坦不良反应(ADR)的发展情况和特点,为临床合理用药提供参考。**方法** 收集某医院 2009-2014 年 139 例头孢哌酮舒巴坦不良反应监测报告资料,对患者的性别、年龄、发生时间、ADR 累及器官或系统及临床表现、转归情况等方面分类统计和分析。**结果** 139 例 ADR 中,女性占总例数的 52.52% (73 例),略高于男性;年龄以大于 60 岁以上人群发生最多,占总例数的 29.50% (41 例);65 例 (占总例数的 46.76%) 在用药后 1~30 min 时出现不良反应;主要 ADR 类型为皮肤及其附件损害,其次为胃肠道系统损害,分别占总例数的 27.46% 和 18.31%;除 1 例发生有后遗症外,其余 ADR 的预后转归较好。**结论** 应重视和加强头孢哌酮舒巴坦的临床应用和管理,提高合理用药水平,确保患者用药安全。

【关键词】 头孢哌酮舒巴坦;药物副反应报告系统;回顾性研究

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.018

作者单位:200050 上海市,上海电力医院药剂科

如何降低基层医院剖宫产率

姜琪

【摘要】 **目的** 探讨降低剖宫产率的对策。**方法** 对某医院 2 年间剖宫产术指征、剖宫产率进行分析原因。**结果** 剖宫产术指征主要以社会因素、胎儿窘迫、瘢痕子宫、头盆不称较多。2013 剖宫产率为 51.1%，2014 年剖宫产率 37.8%。**结论** 剖宫产率与诸多因素有关，只有通过医生、患者、社会的共同努力，合理掌握剖宫产指征，才能更好地降低剖宫产率。

【关键词】 剖宫产术；因果律

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.019

作者单位:324109 浙江省江山,江山市贺村中心卫生院妇产科

无创通气与有创通气在晚期弥漫间质性肺病患者的应用比较

刘新桥 靳凯 梁春芳 马伟松 王伟

【摘要】 目的 研究应用无创通气治疗晚期发生呼吸衰竭的弥漫间质性肺病患者(ILD)的价值。方法 ILD 患者,男 7 例,女 5 例;等分为两组,A 组行无创通气,选用伟康(BiPAP Vision)双水平正压无创呼吸机,模式为 S/T 模式。B 组行有创通气,选用 PB840 呼吸机,通气模式为 SIMV + PSV 或 PSV。结果 晚期弥漫间质性肺病采用无创通气后心率、呼吸、氧分压、二氧化碳分压、氧合指数方面得到与有创通气相当的治疗效果,差异无统计学意义($P > 0.05$)。通气时间、并发症、住院费用方面,无创通气明显好于有创通气,差异有统计学意义($P < 0.01$)。结论 无创通气相比有创通气的优点:上机脱机简单,并发症少;患者依从性好;治疗费用低。无创通气可应用于 ILD 患者。

【关键词】 肺疾病,间质性;插管法,气管内;连续气道正压通气

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.020

作者单位:065700 河北省廊坊,廊坊市第四人民医院急诊科

甲状腺鳞癌合并多发性肌炎一例

康晓菲 焦月江 汪增方

女,70岁,以“反复四肢肌肉疼痛、无力2月”为主诉就诊河南科技大学第一附属医院。查体提示四肢肌力稍下降,触压痛明显,以四肢近端大肌群为著(三角肌、肱二头肌、肱三头肌、臀肌、股四头肌等),肌力4级,双侧对称。甲状腺未触及结节及肿大,其余体检均未见明显异常。既往史:患者高血压病10年,近2年口服氨氯地平5 mg/d联合培哌普利

4 mg/d,血压控制可。无烟酒嗜好。化验检查:甲状腺功能TSH29.8 mU/L,TT3是0.89 nmol/L,TT4是37.2 nmol/L,TPOAb>1300 IU/mL;肌酸激酶(CK)6902U/L。胸部X线片提示心影呈靴型,心胸比0.58,双肺纹理增粗。初步诊断为自身免疫性甲状腺病、甲状腺功能减退症、甲减性肌病,给予左甲状腺素片25 μg/d口服。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.021

作者单位:471003 河南省洛阳,河南科技大学第一附属医院创伤急救中心(康晓菲),内分泌科(焦月江),肿瘤外科(汪增方)

腰椎间盘突出症合并范科尼综合征一例

陈支国 谢曲 徐芳 胡蓉 彭维涛 李磊 王文虎

男,60岁,主诉:进行性加重腰腿痛半年,伴下肢无力半月。由湖北省石首市骨科医院2014年5月收治。入院体格检查:腰椎侧凸,前屈明显受限,腰5棘突间压痛,右旁侧指压沿坐骨神经放射痛,直腿抬高试验(+),右小腿前外侧、足内侧痛触觉减退,肌力IV级。腰椎CT:腰4-5椎间盘突出并部分脱出(右侧)。诊断:腰椎间盘突出。行“腰椎后路椎间盘髓核摘除术+椎板切除减压神经根管探查透视下固定融合术”,术后切口愈合良好,腰腿痛明显改善。7月复诊诉:腰痛,双下肢麻木、乏力。考虑神经损伤,给予口服甲钴胺0.5mg,3次/d,普瑞巴林胶囊150mg,2次/d,8月复诊诉:腰痛改善不明显,下肢麻木、乏力加重,过台阶易摔跤,

准备起诉医院。体格检查:血压:130/78mmHg,心率80次/min。心肺检查未见异常。腰椎无侧凸,棘突间无压痛,腰部无明显压痛区,四肢肌力V级,右下肢肌张力增高,直腿抬高试验(-),生理反射存在,霍夫曼征(+),两侧巴宾斯基征(+)。实验室检查:本周氏蛋白(-),RF(-),肌酐 $108\mu\text{mol/L}$,碱性磷酸酶408U/L,尿酸 $96\mu\text{mol/L}$,钾 3.87mmol/L ,钠 138mmol/L ,钙 1.18mmol/L ,镁 0.94mmol/L ,无机磷 0.46mmol/L ,空腹血糖 8.05mmol/L ,尿糖(+),尿蛋白(+),24h尿蛋白定量250mg,免疫学检查均为阴性。脊柱、头颅核磁共振成像:腰椎黄韧带钙化(轻度),颈椎、腰椎退行性变,脊髓未见占位。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.022

作者单位:434400 湖北省石首市骨科医院内科(陈支国、徐芳、胡蓉),
骨科(谢曲、彭维涛、李磊);湖北省荆州市第二人民医院肝病科(王文虎)

菊池病一例

彭中辉 程伟

女,16岁。因左侧颈部包块4~5年,发热1月就诊。患者数年前左侧颈部皮下出现无痛性包块,生长缓慢,未做特殊治疗。2010年6月颈部包块数目增多,出现疼痛,并伴间歇性发热。于外院抗炎治疗后肿块疼痛消失,大小无变化,仍有发热,并伴左侧鼻出血,乃至我院就诊。病程中无明显鼻塞,无涕中带血,无反复咽痛,无咳嗽、咳痰,无盗汗、乏力及消瘦。既往体健,无结核病史及接触史。专科检查:T37.8℃,左颈侧沿胸锁乳突肌表面及后缘皮下触及多个肿大淋巴结,大者约1.5cm×1.3cm,小者约1cm×0.8cm,串珠样排列,质较软,表面光滑,边界尚清,压痛(+)。耳、咽、鼻腔、鼻咽部未见异常。血常规:白细胞 $1.53 \times 10^9/L$,中性粒细胞计数 $1.21 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.79,淋巴细胞0.18,

血沉15mm/h。血培养未见异常。入院后予抗炎、解热、对症治疗,症状无明显改善。进一步检查:免疫球蛋白各项指标正常,风湿系列各抗体(-),RF(-),抗O<200IU/ml,疟原虫(-)。PPD试验(-)。胸片未见结核病变。颈部增强CT:左侧颈鞘后方、左侧锁骨上窝多发增大淋巴结,考虑可能为淋巴结结核。鼻咽部CT未见明显异常。后行颈部肿块细胞学穿刺提示颈部淋巴结结核可能。继续抗炎、解热、对症治疗,6d后体温降至正常。于局麻下行颈部包块切除术。术后病理:镜下淋巴结构大部分消失,见大片坏死,为干酪样物代替,坏死灶周围见大胞质泡沫样组织细胞(见图1),符合组织细胞坏死性淋巴结炎,确诊菊池病。术后颈部伤口愈合良好,出院随访4年未复发。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.023

作者单位:232001 安徽省淮南,淮南东方医院集团肿瘤医院耳鼻喉科(彭中辉),
淮南市第一人民医院耳鼻喉科(程伟)

乳腺癌化疗后合并间歇性完全性左束支阻滞一例

柏杨 朱铭

女,37岁,于2014年12月初无意中触及右乳外上象限一蚕豆大小硬结,随来我院就诊,门诊彩超检查示:“右乳腺占位”。遂入院,在全麻下行“右乳癌改良根治术”,手术顺利,切除肿块250 mm×260 mm大小,术后病理报告:右乳腺浸润性导管癌。腋下淋巴结0/7、ER++、PR++、HER-2+++、KI-67 30%。术后三周给予TA方案化疗(阿霉素

60 mg次/d,多西他赛120 mg次/d),21 d/周期。患者平素身体健康,否认高血压、心脏病、糖尿病等家族遗传性疾病史。于第五次化疗前常规心电图检查示:“完全性左束支传导阻滞;ST-T继发性改变”。为明确诊断,给予12导联24 h动态心电图检查,患者静息状态下显示为正常心电图图形,活动后为完全性左束支阻滞图形。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.024

作者单位:232001 安徽省淮南,淮南东方肿瘤医院心电图室(柏杨),医教部(朱铭)

地市级医院基本公共卫生服务区乡联动模式探讨

范志红 韩志祥 艾方红

【摘要】 **目的** 探讨地市级医院(鄂州市)实施基本公卫区乡联动服务模式的效果。**方法** 利用三甲医院公卫科的功能和职责,整合技术和设备力量,调动信息流,集中专家队伍,规范信息网络,带动区乡基本公卫工作的开展。**结果** 鄂州市三级医院发挥了主导作用,已与下级医院(太和、葛店)建立了长期协作关系,为科学管理基本公卫项目做出示范。**结论** 综合医院在公卫工作中体现公益性,实现了公卫城乡一体化的格局。

【关键词】 公共卫生;医院,公立;卫生保健改革;合作行为

Discussion on basic public health services in rural area linkage mode of municipal hospital Fan Zhihong, Han Zhixiang, Ai Fanghong. Department of Emergency, the Central Hospital of Ezhou, Ezhou, Hubei 436000, China

【Abstract】 **Objective** To investigate the Municipal Hospital (Ezhou city) the implementation of rural basic public health service mode of linkage of areaeffect. **Methods** The hospital public health division of functions and duties, the integration of technology and equipment strength, mobilize the information flow, focused team of experts, standardize the information network, to carry out drive rural area of basic public health work. **Results** The three level hospitals of Ezhou played a leading role, has been associated with lower hospital (Taihe, Gedian) to establish a long-term cooperative relations, for the scientific management of basic public health items the purpose of the make and model. **Conclusion** The comprehensive hospital, reflect the public interest in public health work, to achieve the integration of urban and rural public health pattern.

【Key words】 Public health; Hospitals, public; Health care reform; Cooperative behavior

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.025

基金项目:湖北省鄂州市高新技术产业项目资助(EC25)

作者单位:436000 湖北省鄂州,鄂州市中心医院急诊科(范志红),药剂科(韩志祥),公卫科(艾方红)

医院的导医工作

苟小婕

【摘要】 **目的** 分析医院导医工作中存在的问题。**方法** 针对问题对导医人员进行服务礼仪的培训及职业道德教育,优化就诊流程。**结果** 导医工作取得了较满意的效果,病人满意度明显提高。**结论** 对患者就诊过程中遇到的问题进行主动耐心的指导,加强导医人员服务的连续性是提高医院综合服务质量的重要举措。

【关键词】 辅助服务,医院;礼仪行为;导医

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.026

作者单位:611934 四川省彭州,彭州市濛阳镇卫生院

结合“军卫一号”信息管理系统开发药品管理系统的设计与应用

沈静萍 单磊敬 于晓波

【摘要】 目的 探讨“军卫一号”信息管理系统中的药品库存管理程序中统计模块的设计缺陷,以及具体的改良途径。**方法** 利用 PowerBuilder 工具,结合 Excel 处理“军卫一号”导出的数据,就药品库存管理程序中统计模块的设计缺陷,提出弥补方法,并对“军卫一号”药库管理软件进行二次开发与升级。**结果** 改良后的药品管理系统,大大提高了药品采购管理工作效率,为合理制订采购计划、防止药品积压提供了依据。**结论** 使用上述方法改良后的药品库存管理系统,可以补充手工管理中所不能及的大量工作,提高了工作效率,实现了功能的完善。

【关键词】 给药系统;医院;库存清册;医院;数据库管理系统;“军卫一号”信息管理系统

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.027

作者单位:066100 河北省秦皇岛,北京军区北戴河疗养院

浅述临床输血护理风险的防范

罗惠如

【摘要】 **目的** 分析临床输血护理工作中的法律风险,提出控制临床输血风险的措施。**方法** 通过对临床输血护理差错事故案例的剖析,对照临床输血护理法律规范要求,分析临床输血护理操作不规范的行为,找出临床输血护理差错发生的原因。**结果** 临床输血护理是安全输血的重要环节,从医师决定给患者输血治疗,填写输血申请单后,护士持输血申请单给患者抽取血样送血库进行检验备血开始,一直到在血库领取输血记录单和血液到给患者输血结束的全过程都存在输血护理风险,实践中因护士不规范的操作导致的临床输血不良事件时有发生,有的对患者身体造成严重损害,甚至发生死亡的后果。**结论** 必须完善临床输血护理质量管理体系,对护理人员进行严格培训,规范关键控制点的操作,防范风险事故发生。

【关键词】 输血;护理;安全管理

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.028

作者单位:030024 山西省太原,山西省血液中心

预冲式冲管注射器盒的多种巧用

王前英 陈先梅

【摘要】 **目的** 介绍巧用预冲式冲管注射器盒的多种方法。**方法** 将一些预冲式冲管注射器空盒回收利用:输血盒,装胰岛素药及笔,储存盒,污物桶等。**结果** 做到了废物利用,节约了医疗资源与护理成本。**结论** 巧用预冲式冲管注射器盒取材方便,制作简单,有效进行了医用废弃物处理。

【关键词】 医用废弃物处理;预冲式冲管注射器盒

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.029

作者单位:436099 湖北省鄂州,鄂州市中心医院耳鼻喉科

优质护理在脑血栓患者护理中的应用

黎娜

【摘要】 目的 研究优质护理对脑血栓患者辅助治疗的临床价值。**方法** 脑血栓患者 110 例,按随机数字表法分为观察组和对照组各 55 例。给予对照组患者一般护理;给予观察组患者优质护理,对比两组患者的住院时间以及日常活动能力。**结果** 观察组的住院时间(15.76 ± 5.95)d,明显少于对照组,且恢复后的日常生活活动能力评分(75.59 ± 10.35)分,明显高于对照组($P < 0.05$)。**结论** 给予脑血栓患者优质护理可以缩短其住院时间,同时也提高了日常活动能力。

【关键词】 颅内血栓形成;日常生活活动;住院时间;护理

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.030

作者单位:430000 湖北省武汉,武汉市第一医院神经内科

“百针计划”加一对一带教模式 在低年资护士培训中的 应用和效果观察

黄亚玲 陈秀红 彭小兰

【摘要】 **目的** 探讨提高低年资护士静脉穿刺一次性成功率,减少因静脉穿刺给患者带来的痛苦,提高患者满意度的有效培训方法。**方法** 对工作 3 年以内的 57 名低年资护士进行“百针计划”强化训练,实施一对一的培训模式,培训内容包括理论、操作、解决问题等综合能力。**结果** 培训后护士的静脉输液技术理论及操作考核成绩较培训前明显提高,差异有统计学意义($P < 0.01$),患者的满意度有所提高,护士自我评价收效较大。**结论** 对低年资护士进行“百针计划”强化训练,实施一对一培训模式,有效的提高了低年资护士的静脉穿刺一次性成功率,提高了护理服务质量。

【关键词】 护士;在职培训;静脉注射

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s1.031

作者单位:436099 湖北省鄂州,鄂州市中心医院门诊输液室

