

# 中国基层医药®

CHINESE JOURNAL OF PRIMARY MEDICINE AND PHARMACY

半月刊 1994年7月创刊 第22卷 增刊2 2015年12月31日出版

**主管**  
中华人民共和国国家卫生和  
计划生育委员会

**主办**  
中华医学会  
100710,北京市东四西大街42号

安徽医科大学  
230032,安徽省合肥市梅山路81号

**编辑**  
中国基层医药编辑委员会  
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号  
电话(传真):(0554)6664827  
(0554)6665318  
Email:cjpmvip@163.com  
http://www.cjpm.com

**总编辑**  
吴孟超 郑芙林

**编辑部主任**  
黄政

**出版**  
中国基层医药杂志社  
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号  
电话(传真):(0554)6665318,6664827  
Email:cjpmvip@163.com

**广告经营许可证号**  
3404000000009

**印刷**  
蚌埠光大彩色制印有限公司

**发行**  
范围:公开  
国内:北京报刊发行局  
国外:中国国际图书贸易集团  
有限公司  
(北京399信箱,100044)  
代号M4777

**订购**  
全国各地邮政局  
邮发代号 82-948

**邮购**  
中国基层医药杂志社  
232001,中国安徽淮南市洞山中路16号  
电话(传真):(0554)6665318,6664827  
Email:cjpmvip@163.com

**定价**  
每期10.00元,全年240.00元

**中国标准连续出版物号**  
ISSN 1008-6706  
CN 34-1190/R

2015年版权归中华医学会所有

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,可向中国基层医药杂志社出版发行部调换

## 目次

### 论著

- 联合治疗方案预防宫腔黏连电切术后再粘连的研究 ..... 1  
杨志永 肖永敏 王莹 张峰 李海霞 张庆元
- 清鱼油霜配制工艺中抗氧化剂的筛选 ..... 5  
何婉敏 聂秀霞 黄彩燕 陈焕梅
- 高原地区肺结核30例X线胸片分析 ..... 7  
田光 花焱 焦标
- 中药配合臭氧治疗膝骨关节炎834例 ..... 10  
李克尊 张春红 崔伟 潘永德 宋兆波
- 超声引导下两种不同硬化剂治疗子宫内膜异位囊肿的  
对比研究 ..... 12  
罗春艳 田太成 王芹
- 无偿献血者抗-HIV确证阳性27例分析 ..... 14  
马惠兰
- 沙美特罗/替卡松粉吸入剂对慢性阻塞性肺疾病稳定期的  
治疗作用 ..... 16  
苏红彬 刘玲 高慧 刘莉
- FP方案与DP方案治疗转移性食管癌的临床疗效  
及毒性反应观察 ..... 18  
马一栋 张莉 钱永红
- 甲泼尼龙联合大环内酯类抗生素治疗小儿  
重症肺炎支原体肺炎临床观察 ..... 21  
彭伶俐
- 全身麻醉中保温毯的使用对术后谵妄发生率的影响 ..... 23  
刘心国 王馨 李佳慧
- 彩超联合数字减影血管造影引导下经皮肝穿刺胆道引流  
治疗急性梗阻性化脓性胆管炎的效果观察 ..... 26  
张伟 王梁

### 研究与实践

- 带线锚钉在慢性踝关节外侧不稳韧带重建中的  
应用效果分析 ..... 28  
马一鸣

穴位注射治疗慢性咽炎 200 例临床分析 .....	30
罗世柏 杨芳 何勇军	
银离子敷料治疗糖尿病合并冠心病患者压疮一例 .....	31
邓斯敏	
接种百日咳、白喉、破伤风混合疫苗出现硬结反应的预防及处理 .....	32
舒忠	
自制中药油膏治疗糖尿病患者压疮一例 .....	34
过源	
阑尾炎误诊 147 例分析 .....	35
王顺	
特布他林联合布地奈德雾化吸入治疗老年痴呆症合并肺部感染一例 .....	37
蔡悦珊 董兴刚	
<b>病例报告</b>	
含服盐酸达克罗宁胶浆致过敏性休克一例 .....	38
黄书祥	
单硝酸异山梨酯注射液联合托拉塞米治疗冠心病、心功能不全患者胸腔积液一例 .....	39
刘琴 过源 冯健 董兴刚	
<b>综    述</b>	
颈动脉斑块稳定性与形态学研究进展 .....	40
李秀文 杨庆彪 员伟强 吴文新	
<b>卫生管理</b>	
湖北省鄂州市中心医院开展食源性疾病监测存在问题及对策 .....	41
廖淑芳 陈先梅 廖青芳	
电子巡更系统在医院后勤精细化管理中的应用成效 .....	43
陈伯勋 杨少俊 李健 李承	
<b>护理学</b>	
子宫穿孔患者术后腹部切口裂开的护理 .....	44
刘燕	
心理护理在急诊外科患者诊疗中的临床意义 .....	45
范克英	
改良压疮风险评估量表在普外科老年患者护理中的应用 .....	46
肖雪梅	
一对一优质护理在糖尿病合并酮症酸中毒患者中的应用 .....	48
江志荣	
<b>中华医学会系列杂志一览表</b> .....	对正文

# 联合治疗方案预防宫腔黏连电切术后再黏连的研究

杨志永 肖永敏 王莹 张峰 李海霞 张庆元

**【摘要】 目的** 通过临床研究对比不同联合治疗方案在预防宫腔黏连电切术(TCRA)后宫腔再黏连方面的疗效差异性,从而探索出最佳的辅助治疗方案。**方法** 中重度宫腔黏连患者 80 例,采取数字表法随机分为 4 个治疗组,A 组人工周期+球囊+透明质酸钠凝胶组;B 组人工周期+放环+透明质酸钠凝胶组;C 组大剂量雌激素+球囊+透明质酸钠凝胶组;D 组大剂量雌激素+放环+透明质酸钠凝胶组。TCRA 后分别予以上四种不同治疗方案治疗 3 个月,术后 1、3 个月行宫腔镜检查。**结果** 随访 6~12 个月,术后 3 个月宫腔形态恢复总治愈率 21.3% (17/80),总有效率 67.5% (54/80),C 组治愈率 45%,在治愈率方面 C 组明显优于其他三组,差异有统计学意义,[其中 C 组与 A 组比较( $\chi^2 = 4.29, P < 0.05$ );C 组与 B 组比较( $\chi^2 = 6.14, P < 0.05$ );C 组与 D 组比较( $\chi^2 = 4.27, P < 0.05$ )]。术后 3 个月停药后排卵期测子宫内膜厚度,治疗前后各组内膜厚度差异均有统计学意义,组间比较,C 组内膜明显厚于其他三组,其中 A、C 组比较( $t = 10.28, P < 0.01$ ),B、C 组比较( $t = 12.80, P < 0.01$ ),D、C 组比较( $t = 5.02, P < 0.01$ )。术后第 5 个月经量恢复情况,总治愈率 23.8% (19/80),总治疗有效率 71.3% (57/80)。其中 C 组治愈率 45%,明显高于其他三组,差异有统计学意义[其中 C 组与 A 组比较( $\chi^2 = 4.29, P < 0.05$ );C 组与 B 组比较( $\chi^2 = 6.28, P < 0.05$ );C 组与 D 组比较( $\chi^2 = 4.27, P < 0.05$ )]。**结论** 大剂量雌激素联合防黏连透明质酸钠凝胶及球囊法可明显改善中重度宫腔黏连的预后,且优于其他联合治疗方案。

**【关键词】** 子宫疾病;组织黏连;球囊扩张术;雌激素;透明质酸;宫内避孕器;预后

## Study on the combined therapy for preventing intrauterine adhesions after transcervical resection

Yang Zhiyong, Xiao Yongmin, Wang Ying, Zhang Feng, Li Haixia, Zhang Qingyuan. The Maternal and Children Health Care Hospital of Linyi, Linyi, Shandong 276000, China

**【Abstract】 Objective** By comparing the effects of different combined therapy, to explore the best therapy in prevention of intrauterine adhesions (IUA) after Transcervical resection of adhesions (TCRA). **Methods** Eighty patents with serious or moderate IUA were randomly divided into four groups. Group A: Artificial cycle combined with ball pouch, sodium hyaluronate gel. Group B: artificial cycle combined with intrauterine device (IUD), sodium hyaluronate gel. Group C: large doses of estrogen drugs combined with ball pouch, sodium hyaluronate gel. Group D: large doses of estrogen drugs combined with IUD, sodium hyaluronate gel. Postoperative patients of TCRA were treated by the four therapies respectively for three months. All patients came back for hysteroscopy in one month and three months after operation. **Results** Following - up period was 6 - 12 months. After three months treatment, the total endometrial cavity cure rate was 21.3% (17/80), the total effective rate was 67.5% (54/80). The cure rate of group C was 45.0%, which was obviously higher than those of the other three groups, the differences were statistically insignificant (group C vs. group A,  $\chi^2 = 4.29, P < 0.05$ ; group C vs. group B,  $\chi^2 = 6.14, P < 0.05$ ; group C vs. group D,  $\chi^2 = 4.27, P < 0.05$ ). After three months treatment, the endometrial thickness were measured during ovulatory period. The thickness of group C was obviously thicker than those of the other three groups, the differences were statistically insignificant (group C vs. group A,  $t = 10.28, P < 0.01$ ; group C vs. group B,  $t = 12.80, P < 0.01$ ; group C vs. group D,  $t = 5.02, P < 0.01$ ). Five months after the operation, in the aspect of menstrual blood volume, the total cure rate was 23.8% (19/80), the total effective rate was 71.3% (57/80). And the cure rate of group C was 45.0%, which was obviously higher than those of the other three groups, the differences were statistically insignificant (group C vs. group A,  $\chi^2 = 4.29, P < 0.05$ ; group C vs. group B,  $\chi^2 = 6.28, P < 0.05$ ; group C vs. group D,  $\chi^2 = 4.27, P <$

0.05). **Conclusion** The therapy of large doses of estrogen drugs combined with ball pouch and sodium hyaluronate gel can significantly improve the prognosis of serious or moderate IUA, and better than other combined therapies.

**【Key words】** Uterine Diseases; Tissue Adhesions; Balloon Dilation; Estrogens; Hyaluronic Acid; Intrauterine Devices; prognosis

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.001

基金项目:山东省临沂市科技发展计划项目(201413060)

作者单位:276000 山东省临沂,临沂市妇女儿童医院妇科

# 清鱼油霜配制工艺中抗氧化剂的筛选

何婉敏 聂秀霞 黄彩燕 陈焕梅

**【摘要】** 目的 考察抗氧化剂组成及用量对清鱼油霜的影响,提高清鱼油霜的稳定性。方法 分别制备含维生素 C(VC)、维生素 E(VE)、乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)、焦亚硫酸钠等不同抗氧化剂清鱼油霜,HPLC 法测定加速实验 6 个月及长期留样 12 个月后制剂中维生素 A 的含量。结果 加入抗氧化剂对清鱼油霜中维生素 A 含量有明显影响,其中影响效果  $VE + Na_2S_2O_5 > VC + Na_2S_2O_5 > VE + EDTA-2Na > VC + EDTA-2Na > VE > Na_2S_2O_5 > VC > EDTA-2Na$ 。结论 加入抗氧化剂增强了清鱼油霜的稳定性,复合抗氧化剂效果优于单一抗氧化剂。

**【关键词】** 鱼油;维生素 A;抗氧化剂

**Screen the antioxidants in the preparation process of fish oil cream** He Wanmin, Nie Xiuxia, Huang Caiyan, Chen Huanmei. Department of Pharmacy, the Second People's Hospital of Zhongshan, Zhongshan, Guangdong 528447, China

**【Abstract】 Objective** To investigate the effects of antioxidant on the fish oil cream and to enhance its stability. **Methods** The fish oil cream containing different antioxidant such as vitamin C, vitamin E, EDTA - 2Na were prepared. The content of vitamin A with 6 months acceleration test and 12 months after long - term test were determined by HPLC. **Results** Antioxidants had significant effect on the vitamin A content in fish oil cream, the sequence that antioxidants enhance the stability of the fish oil cream was as follows:  $VE + Na_2S_2O_5 > VC + Na_2S_2O_5 > VE + EDTA - 2Na > VC + EDTA - 2Na > VE > Na_2S_2O_5 > VC > EDTA - 2Na$ . **Conclusion** The fish oil cream with antioxidant have favorable stability, composite antioxidant is better than single antioxidant.

**【Key words】** Fish oils; Vitamin A; Antioxidants

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.002

基金项目:广东省中山市卫生和计划生育局医学科研资助项目(2015J129)

作者单位:528447 广东省中山,中山市第二人民医院药剂科

# 高原地区肺结核 30 例 X 线胸片分析

田光 花焱 焦标

**【摘要】** 目的 提高对藏东林芝地区肺结核 X 线表现的认识,更好地指导临床早期诊断。方法 回顾性分析藏东林芝地区肺结核患者 30 例的影像特点,初诊均拍摄胸部 X 线平片。结果 原发型肺结核未发现;血行播散型肺结核 5 例(16%),影像表现成分混杂的致密影,可见钙化及卫星灶;浸润型肺结核 8 例(26%),影像表现两肺弥漫分布的结节影;纤维空洞型肺结核 17 例(58%),影像表现空洞、纤维化、支气管播散三大特征,病变范围广,尤其表现以渗出浸润为主,分布在肺基底部及前部。结论 高原地区肺结核以浸润型和纤维空洞型为主,有特定的影像特点,可以用来进行诊断。并且其 X 线表现有明显不同于内地城市的特点。

**【关键词】** 结核,肺;放射摄影术,胸部;高海拔;西藏[自治区]

**X-ray analysis of 30 cases of pulmonary tuberculosis in plateau section** Tian Guang, Hua Yan, Jiao Biao.  
Navy General Hospital, Beijing 100048, China

**【Abstract】 Objective** To improve the understanding of tuberculosis X-ray performance at Linzhi region in the east of Tibet, in order to better guide clinical early diagnosis. **Methods** The X-ray image characteristics of 30 patients with pulmonary tuberculosis from Linzhi region in the east of Tibet were retrospectively analyzed, Original they all took chest plain films at initial diagnosis. **Results** The original hairstyle tuberculosis was not found; Blood type disseminated tuberculosis in 5 cases (16%). Composition of mixed density shadow image performance, calcification and satellite stove were founded; Invasion tuberculosis were in 8 cases (26%), images showed two pulmonary diffuse distribution of nodular shadows; Hollow fiber tuberculosis were in 17 cases (58%), images showed empty, fibrosis, endobronchial spread of three characteristics, and lesions was wide, especially with effusion infiltration priority, which were distributed in the lung base and at the front. **Conclusion** Plateau pulmonary tuberculosis with invasion and fiber cavity is given priority to, and have a specific image characteristics, it can be used for diagnosis. And its X-ray performance are significantly different from that of mainland cities.

**【Key words】** Tuberculosis, Pulmonary; Radiography, Thoracic; Altitude; Tibet

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.003

作者单位:100048 北京市,海军总医院(田光、花焱);西藏自治区林芝巴宜区人民医院(焦标)

# 中药配合臭氧治疗膝骨关节炎 834 例

李克尊 张春红 崔伟 潘永德 宋兆波

**【摘要】** **目的** 探讨中药内服、外敷配合关节腔内臭氧注射综合治疗膝骨关节炎的疗效。**方法** 膝骨关节炎患者 834 例,1 212 个膝关节,采用中药内服、外敷配合关节腔内臭氧注射综合治疗,2 个疗程后,以优、良、可及差四个等级对治疗效果进行评价。**结果** 经过 2 个疗程的综合治疗后,834 例中优 534 例,良 461 例,可 181 例,差 36 例,优良率 82.1%。**结论** 中药内服、外敷配合关节腔内臭氧注射的综合治疗方法,可有效的治疗膝骨关节炎。

**【关键词】** 骨关节炎;膝;中草药;臭氧;治疗结果

**Traditional Chinese medicine combined with ozone in the treatment of 834 patients with knee joint osseous arthritis** Li Kezun, Zhang Chunhong, Cui Wei, Pan Yongde, Song Zhaobo. Department of Orthopedics, the Traditional Chinese Medicine Hospital of Gaomi, Gaomi, Shandong 261500, China

**【Abstract】** **Objective** To investigate the effect of comprehensive treatment in the treatment of knee osteoarthritis by taking orally and external Chinese medicine with ozone injected the joint cavity. **Methods** 834 patients with knee osteoarthritis (1 212 knee joints) were randomly selected, after two courses of the comprehensive treatment, with excellent, good, fair and bad four levels to evaluate the therapeutic effect. **Results** After two courses of comprehensive treatment, 534 cases were excellent, 461 cases were good, 181 cases were fair, 36 cases were bad, the fine rate was 82.1%. **Conclusion** The comprehensive treatment is an effective method in knee osteoarthritis by taking orally and external Chinese medicine with ozone injected the joint cavity.

**【Key words】** Osteoarthritis, Knee; Drugs, Chinese Herbal; Ozone; Treatment Outcome

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.004

作者单位:261500 山东省高密,高密市中医院骨病科

# 超声引导下两种不同硬化剂治疗 子宫内膜异位囊肿的对比研究

罗春艳 田大成 王芹

**【摘要】 目的** 探讨超声引导下运用新型硬化剂聚桂醇(乙氧硬化醇)和无水乙醇两种不同硬化剂对子宫内膜异位囊肿进行硬化治疗的疗效。**方法** 两组病例,一组 36 例内膜异位囊肿在超声引导下无水乙醇硬化治疗(乙醇组),另一组 30 例内膜异位囊肿在超声引导下注入 1% 聚桂醇硬化治疗(聚桂醇组)。**结果** 每 3 个月进行随访,最长随访时间为 2 年,最短时间为 9 个月,乙醇组运用乙醇硬化治疗中:总有效率 95.0% (除去一个因剧痛而停止治疗的患者),第 1 年复发率 12.5%,第 2 年复发率 17.5%;聚桂醇组 30 例运用聚桂醇硬化治疗中:总有效率 94.2%,第 1 年复发率 11.7%,第 2 年复发率 17.6%。**结论** 超声引导下无水乙醇和聚桂醇硬化治疗子宫内膜异位囊肿准确性高、治疗效果、复发率均差异无统计学意义,但聚桂醇对人体刺激性小,患者无明显疼痛感,易于接受,而乙醇治疗者大部分患者感觉程度的疼痛,偶有患者由于剧痛而停止治疗。

**【关键词】** 子宫内膜异位症; 超声检查,介入性;硬化疗法

## Contrast research of two different hardener guided by ultrasound in the treatment of endometriosis cysts

Luo Chunyan, Tian Taicheng, Wang Qin. Department of Ultrasound, the People's Hospital of Changyang Tujia Autonomous County, Hubei 443500, China

**【Abstract】 Objective** To explore the effect of new hardener gathered cinnamyl alcohol (hardening of the oxygen ethyl alcohol) and anhydrous ethanol in the treatment of endometriosis cysts guided by ultrasound. **Methods** Two groups of cases, a group of 36 cases of endometriosis cyst in anhydrous ethanol sclerotherapy under the guidance of ultrasound (anhydrous ethanol group), another group of 30 cases of endometriosis cyst under the ultrasonic guided into 1% poly cinnamyl alcohol hardening treatment (poly cinnamyl alcohol group). **Results** Following - up every 3 month, the longest time was 2 years follow - up, the shortest time was 9 months. The anhydrous ethanol group: the total effective rate was 95.0% (excluding a patients discontinue treatment due to severe pain), and the recurrence rate of 12.5% in the first year, second year recurrence rate 17.5%; The poly cinnamyl alcohol group: the total effective rate was 94.2%, the recurrence rate of in the first year was 11.7%, second year recurrence rate was 17.6%. **Conclusion** Anhydrous ethanol and cinnamyl alcohol hardening treatment of endometriosis cyst accuracy guided by ultrasound is high, the treatment effect, the recurrence rate has no obvious difference, but small poly cinnamyl alcohol irritating to human body, the patient has no obvious pain, easy to accept, and people feel ethanol treatment most patients with pain, with occasional patients discontinue treatment due to severe pain.

**【Key words】** Endometriosis; Ultrasonography, Interventional; Sclerotherapy

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.005

作者单位:443500 湖北省长阳土家族自治县人民医院超声科



# 无偿献血者抗-HIV 确证阳性 27 例分析

马惠兰

**【摘要】** **目的** 通过对无偿献血以来献血者抗-HIV 确证阳性结果分析,了解无偿献血人群 HIV 病毒感染特点及分布情况。**方法** 用 ELISA 三代和四代试剂进行血液抗-HIV 检测,免疫印迹法(westem blot, WB) 进行确认。**结果** 1999 年 6 月至 2014 年 6 月,对 176 024 例无偿献血者血液进行抗-HIV 检测,检测阳性 274 例占 0.16%,确证阳性 27 例占 0.015%,确证阳性均为 HIV-1 型病毒感染,在确证阳性中,男性 23 例占 85.2% 远大于女性比例;年龄 19~30 岁 16 例,占总人数 59.3%;职业方面农民 13 例占 48.2% 远大于其他职业;文化程度基本低于大专水平;地区分布主要是榆次 9 例,其余每县市各占 1~2 例,外地流动人员、学生 3 例,民工 1 例。**结论** HIV 确证阳性呈逐年上涨趋势,人群分布广泛,从以往高危人群扩散到普通人群,针对目前状况要加强无偿献血宣传招募和血液筛查力度,确保血液安全。

**【关键词】** 供血者;HIV 血清阳性;HIV 感染

**Analysis of anti - HIV confirmed positive blood of 27 voluntary blood donors** Ma Huilan. Department of Laboratory, the Central Blood Station of Jinzhong, Jinzhong, Shanxi 030600, China

**【Abstract】 Objective** In order to understand the characteristics and the distribution of HIV infection among voluntary blood donation population by analyzing the result about anti - HIV confirmed positive blood of the blood donors. **Methods** In the study, researchers used ELISA three and four generations of reagents to carry out anti - HIV blood test, and used the Western Blot to confirm the result. **Results** 176 024 cases of blood collected from voluntary blood donors had been made anti - HIV blood test, between June 1999 and June 2014. The result showed that 274 cases were testing positive, accounting for 0.16%, and 27 cases were confirmed positive, accounting for 0.015%. All the confirmed positive bloods were HIV - 1 type virus infection. In the confirmed positive, 23 male patients accounted for 85.2%, and it was greater than the proportion of women; age ranged from 19 to 30 years (16 cases, accounting for 59.3% of the total number; professional farmers in 13 cases accounted for 48.2% and it was bigger than other occupations; The cultural degree was less than college level; The regional distribution was mainly in Yuci in 9 cases, each of the remaining counties each accounted for 1 ~ 2 cases, 3 cases in the field of mobile staff, students, migrant workers in 1 case. **Conclusion** The number of confirmed positive is rising up year by year, and the distribution of HIV infection population is widespread and spread from high - risk groups to the general population. According to the recent situation, the author suggests to ensure the blood safety, it is necessary to do that increasing the publicity and recruitment about the voluntary blood donation, and strengthening blood screening efforts.

**【Key words】** Voluntary blood donation, Anti - HIV, Confirmed positive blood, HIV - infected persons

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.006

作者单位:030600 山西省晋中,晋中市中心血站检验科

# 沙美特罗/替卡松粉吸入剂对慢性阻塞性肺疾病稳定期的治疗作用

苏红彬 刘玲 高慧 刘莉

**【摘要】 目的** 观察沙美特罗/替卡松粉吸入剂(舒利迭)和沙丁胺醇联合布地奈德雾化吸入治疗在慢性阻塞性肺疾病(COPD)稳定期的治疗效果。**方法** 确诊为 COPD 稳定期患者 50 例按随机数字表法分为治疗组和对照组。治疗组给予沙美特罗/替卡松粉吸入剂(舒利迭,规格 50/250  $\mu\text{g}$ ) 1~2 吸/次,2 次/d,疗程 24 周;对照组给予常规沙丁胺醇 2 mg 联合布地奈德 1 mg 雾化吸入,2 次/d,对比治疗前后的患者临床症状的改善。**结果** 对照组:治疗前:FEV<sub>1</sub>(L):(1.1±0.4);FEV<sub>1</sub>% 预计值:(22.5±5.1)%;FEV<sub>1</sub>/FVC%:(25.3±5.8)%;治疗后:FEV<sub>1</sub>(L):(1.51±0.72);FEV<sub>1</sub>% 预计值:(29.4±6.2)%;FEV<sub>1</sub>/FVC%:(32.8±6.6)% 治疗组:治疗前:FEV<sub>1</sub>(L):(1.1±0.6);FEV<sub>1</sub>% 预计值:(24.5±5.6)%;FEV<sub>1</sub>/FVC%:(26.7±6.6)%;治疗后:FEV<sub>1</sub>(L):(1.7±0.6);FEV<sub>1</sub>% 预计值:(33.4±7.8)%;FEV<sub>1</sub>/FVC%:(37.8±8.6)%。**结论** COPD 稳定期患者吸入舒利迭治疗,能够显著改善患者肺功能,优于沙丁胺醇联合布地奈德吸入治疗。

**【关键词】** 肺疾病,慢性阻塞性;沙丁胺醇;布地奈德;沙美特罗/替卡松粉吸入剂;治疗结果

**The treatment effect of Shah Mette Lo/fluticasone inhalation for stable stage of chronic obstructive pulmonary disease** Su Hongbin, Liu Ling, Gao Hui, Liu Li. Department of Respiratory, the Second People's Hospital of Renshou County, Sichuan 620575, China

**【Abstract】 Objective** To observe the treatment effect of Shah Mette Lo/fluticasone inhalation(Seretide) for stable stage of chronic obstructive pulmonary disease(COPD). **Methods** 50 patients with COPD were randomly divided into treatment group and control group. The treatment group was given Seretide (specifications of 250 $\mu\text{g}$ ) 1-2 ceiling/time, 2 times/day, after 24 weeks of treatment, the control group was given 2mg of regular salbutamol combined with budesonide 1mg atomization inhalation, 2 times daily. The clinical symptoms were compared before and after treatment. **Results** In the treatment group, acute seizure frequency was significantly reduced, cough, wheezing singing decreased or disappeared, self-care ability improved, the control group had no obvious change. The control group: before treatment FEV<sub>1</sub>(1.1±0.4) L; FEV<sub>1</sub>% predicted value(22.5±5.1)%; FEV<sub>1</sub>/FVC%:(25.3±5.8)%; after treatment FEV<sub>1</sub>(1.5±0.7) L; FEV<sub>1</sub>% predicted value(29.4±6.2)%; FEV<sub>1</sub>/FVC%:(32.8±6.6)%. The treatment group: before treatment FEV<sub>1</sub>(1.1±0.6) L; FEV<sub>1</sub>% predicted value(24.5±5.6)%; FEV<sub>1</sub>/FVC%:(26.7±6.6)%; after treatment FEV<sub>1</sub>(1.7±0.6) L; FEV<sub>1</sub>% predicted value(33.4±7.8)%; FEV<sub>1</sub>/FVC%:(37.8±8.6)%. **Conclusion** In patients with stable COPD inhaled Seretide treatment can significantly improve lung function, and it is better than sardine an alcohol combined with budesonide inhalation therapy.

**【Key words】** Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Albuterol; Budesonide; Shah Mette Lo/fluticasone propionate; Treatment Outcome

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.007

作者单位:620575 四川省仁寿县第二人民医院呼吸内科

# FP 方案与 DP 方案治疗转移性食管癌的 临床疗效及毒性反应观察

马一栋 张莉 钱永红

**【摘要】 目的** 观察氟尿嘧啶联合顺铂方案(FP)和多西他赛联合顺铂方案(DP)治疗转移性食管癌的疗效和毒性反应。**方法** 回顾性分析经病理组织学和/或细胞学检查证实初治转移性食管癌 68 例,其中 FP 方案组 33 例(5-Fu 500 mg/m<sup>2</sup>, d1 ~ 5; DDP 20 mg/m<sup>2</sup>, d1 ~ 5, q28d), DP 方案组 35 例(DTX 75 mg/m<sup>2</sup>, d1, DDP 20 mg/m<sup>2</sup>, d1 ~ 3, q21d)。每两个周期全面复查评价疗效及毒副作用,并对两组患者进行对比分析比较。**结果** FP 组 CR 1 例, PR 12 例, SD 16 例, PD 4 例; DP 组 CR 3 例, PR 18 例, SD 11 例, PD 3 例; DP 组患者的客观缓解率(68.57%)明显高于 FP 组(36.39%),差异有统计学意义( $\chi^2 = 5.83, P = 0.02$ );疾病控制率差异无统计学意义( $P = 0.71$ );毒副作用方面, DP 组 III ~ IV 度骨髓抑制发生率高于 FP 组,差异有统计学意义( $\chi^2 = 7.07, P = 0.01$ ),恶心、呕吐、腹泻及肝功能损害等毒副作用发生率两组差异无统计学意义( $P > 0.05$ )。**结论** 对于转移性食管癌患者的化疗, DP 方案较 FP 方案具有更好的客观缓解率,尽管骨髓抑制发生率较高,但经过及时处理后患者多能耐受,值得进一步研究及临床推广应用。

**【关键词】** 食管肿瘤;氟尿嘧啶;顺铂;多西他赛

**Observation of the efficacy and toxicity of docetaxel plus cisplatin and 5 - Fluorouracil plus cisplatin in the treatment of metastatic esophageal cancer** Ma Yidong, Zhang Li, Qian Yonghong. Department of Oncology, the Fifth People's Hospital of Datong, Datong, Shanxi 037009, China

**【Abstract】 Objective** To observe the efficacy and toxicity of 5 - Fluorouracil plus cisplatin (FP) and docetaxel plus cisplatin (DP) in the treatment of patients with metastatic esophageal cancer. **Methods** A total number of 68 cases of metastatic esophageal cancer confirmed by histopathology and (or) cytological examination was analyzed retrospectively. There were 33 cases in FP group (5 - Fu 500mg/m<sup>2</sup>, d1 - 5; DDP 20mg/m<sup>2</sup>, d1 - 5, 28 days a cycle), and 35 cases were in DP group (DTX 75mg/m<sup>2</sup>, d1, DDP 20mg/m<sup>2</sup>, d1 - 3, 21 days a cycle). The evaluation of efficacy and toxicity were performed on all patients per 2 cycles. Statistics and analysis of the difference between the two groups was performed. **Results** For FP group, CR was in 1 case, PR ere in 12 cases, SD ere in 16 cases and PD ere in 4 cases, respectively. The corresponding value was 3, 18, 11 and 3 for DP group. The objective response rate (ORR) for DP group (68.57%) was significantly higher than FP group (36.39%) ( $\chi^2 = 5.83, P = 0.02$ ), and the disease control rate (DCR) were similar with no significance between the two groups ( $P = 0.71$ ). The III - IV degree myelotoxicity for DP group was higher than for FP group with statistical difference ( $\chi^2 = 7.07, P = 0.01$ ), while the incidence of nausea, vomiting, diarrhea and liver toxicity was similar ( $P > 0.05$ ). **Conclusion** DP regimen was more effective than FP regimen for the metastatic esophageal cancer, and the patients can tolerate with the slightly higher incidence of myelotoxicity, it was worthy of further study and clinical application.

**【Key words】** Esophageal Neoplasms; Fluorouracil; cisplatin; Docetaxel

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.008

作者单位:037009 山西省大同,大同市第五人民医院肿瘤科(马一栋);大同煤矿集团有限责任公司肿瘤医院放疗科(张莉、钱永红)

# 甲泼尼龙联合大环内酯类抗生素治疗 小儿重症肺炎支原体肺炎临床观察

彭伶俐

**【摘要】 目的** 观察甲泼尼龙治疗小儿重症肺炎支原体肺炎临床疗效。**方法** 将符合肺炎支原体肺炎诊断的患儿 100 例分为对照组与治疗组;对照组给予大环内酯抗生素抗感染、对症、支持等常规治疗,治疗组在常规治疗方法上加用甲泼尼龙干预治疗,剂量  $2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1} \times 5 \text{ d}$ 。观察两组患儿咳嗽减轻、体温降至正常时间、肺部啰音消失及住院时间变化,胸片提示病变吸收时间变化情况。**结果** 治疗组患儿咳嗽减轻时间、体温降至正常时间、肺部啰音消失时间、影像学提示肺部病变吸收时间、住院时间分别为  $(5.46 \pm 2.03) \text{ d}$ 、 $(3.35 \pm 1.79) \text{ d}$ 、 $(7.08 \pm 2.56) \text{ d}$ 、 $(7.89 \pm 1.44) \text{ d}$ 、 $(10.15 \pm 2.03) \text{ d}$ ;对照组分别为  $(4.23 \pm 1.59) \text{ d}$ 、 $(5.00 \pm 2.3) \text{ d}$ 、 $(9.07 \pm 1.9) \text{ d}$ 、 $(9.23 \pm 1.64) \text{ d}$ 、 $(12.76 \pm 2.03) \text{ d}$ 。治疗组体温降至正常时间、肺部啰音消失及住院时间变化,肺部病变吸收时间均短于对照组(均  $P < 0.05$ ),但咳嗽减轻时间与对照组差异无统计学意义( $P > 0.05$ )。两组间治愈率差异有统计学意义( $\chi^2 = 5.488, P < 0.05$ )。**结论** 甲泼尼龙治疗重症肺炎支原体肺炎临床疗效肯定,应用安全、值得临床上推广应用。

**【关键词】** 肺炎支原体肺炎;甲泼尼龙;儿童

**Clinical observation of methylprednisolone in the treatment of children with severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia** Peng Lingli. Department of Pediatrics, the Maternal and Child Health Care Hospital of Shunyi District, Beijing 101300, China

**【Abstract】 Objective** To observe the clinical efficacy of methylprednisolone in the treatment of children with severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia (MPP). **Methods** 100 children with severe MPP were divided into control group and treatment group. The control group was given to macrocyclic lactone antibiotics, symptomatic and supportive and other conventional treatment. The treatment group was given to Methylprednisolone dose for  $2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1} \times 5 \text{ d}$  at the base of the control group. The clinical manifestations, such as the time of reducing cough, the temperature dropped to normal time, pulmonary rales disappeared time, affection absorption time, as well as length of the stay were observed. **Results** The time of reducing cough, temperature dropped to normal time, pulmonary rales disappeared time and the affection absorption time of the treatment group were  $(5.46 \pm 2.03) \text{ days}$ ,  $(3.35 \pm 1.79) \text{ days}$ ,  $(7.08 \pm 2.56) \text{ days}$ ,  $(7.89 \pm 1.44) \text{ days}$ ,  $(10.15 \pm 2.03) \text{ days}$  respectively, which of the control group were  $(4.23 \pm 1.59) \text{ days}$ ,  $(5.00 \pm 2.30) \text{ days}$ ,  $(9.07 \pm 1.9) \text{ days}$ ,  $(9.23 \pm 1.64) \text{ days}$ ,  $(12.76 \pm 2.03) \text{ days}$  respectively. The temperature dropped to normal time, pulmonary rales disappeared time and the affection absorption time of the treatment group were shorter than the control group (all  $P < 0.05$ ), but the time of reducing cough between the two groups had no significant difference ( $P > 0.05$ ). There was significant difference in cure rate between the two groups ( $\chi^2 = 5.488, P < 0.05$ ). **Conclusion** The efficacy of methylprednisolone therapy for children with grave Mycoplasma pneumoniae pneumonia (MPP) is affirmation, worthy of clinical application.

**【Key words】** Mycoplasma pneumoniae pneumonia; Methylprednisolone; Child

# 全身麻醉中保温毯的使用对术后谵妄发生率的影响

刘心国 王馨 李佳慧

**【摘要】** 目的 观察全身麻醉手术过程中使用保温毯对术后谵妄发生率的影响。方法 选取择期腹腔镜胆囊切除术的患者 60 例,ASA 分级为 I ~ II 级,按照随机数字表法将患者分为两组,分别为:手术过程中没有使用保温毯组(无保温毯组, $n = 30$ );手术过程中使用保温毯组(保温毯组, $n = 30$ )。手术过程中麻醉用药的剂量和药物批号是一致的。采用谵妄评定方法中文修订版(CAM-CR)对两组患者进行评定,记录在术后 24 h、48 h、72 h 两组的谵妄累计发生例数。结果 无保温毯组的术后谵妄的发生率为 6.7%,保温毯组的术后谵妄的发生率为 0,两组差异有统计学意义( $P < 0.05$ )。结论 手术中使用保温毯对患者进行身体保温可降低术后谵妄的发生率。

**【关键词】** 谵妄;手术后并发症;麻醉,静脉;保温毯

## Influence of the insulation blanket applied in general anesthesia on the incidence of postoperative delirium

Liu Xinguo, Wang Xing, Li Jiahui. Department of Anesthesiology, the Fifth People's Hospital of Jinan, Jinan, Shandong 250022, China

**【Abstract】 Objective** To observe the influence of the insulation blanket applied in general anesthesia on the incidence of postoperative delirium. **Methods** 60 patients with elective laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia with ASA of grade I - II were selected. According to the random number table, the patients were divided into group A (without insulation blanket) and group B (with insulation blanket), each group in 30 cases. The dosage and drug batch number of anesthetic drugs were same. Evaluated each patient using the confusion assessment method - chinese revised (CAM - CR). Recorded the number of cases of delirium for each group when 24 hours, 48 hours, 72 hours after operation. **Results** The incidence of postoperative delirium in group A was 6.7%, which in group B was 0.0%. The incidence of postoperative delirium of group B was lower than group A ( $P < 0.05$ ). **Conclusion** Using insulation blanket to protect body temperature in perioperative operation can reduce the incidence of postoperative delirium in perioperative operation.

**【Key words】** Delirium; Postoperative Complications; Anesthesia, Intravenous; Intravenous anesthesia

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.010

作者单位:250022 山东省济南,济南市第五人民医院麻醉科

# 彩超联合数字减影血管造影引导下经皮肝穿刺胆道引流治疗急性梗阻性化脓性胆管炎的效果观察

张伟 王梁

**【摘要】 目的** 观察彩超联合数字减影血管造影(DSA)引导下经皮肝穿刺胆道引流(PTCD)治疗高龄急性化脓性胆管炎(AOSC)患者的疗效。**方法** 住院治疗的 62 例高龄 AOSC 患者,根据不同手术方法分为联合组(彩超联合 DSA 组,  $n=35$ )和 DSA 组( $n=27$ ),全部施行 PTCD 胆汁体外引流术,观察治疗效果,比较两组手术操作时间、手术成功率、并发症(胆道出血、胆汁外漏、引流管移位等)。**结果** 均无死亡病例。联合组 35 例均一次性完成 PTCD,平均手术时间 23 min,胆道出血 1 例,胆汁沿引流管外渗漏 1 例,胆漏合并胆道出血 0 例,胆道引流管出现移位 0 例。DSA 组 27 例,仅有 10 例一次性完成 PTCD,2~5 次穿刺成功的有 17 例,平均手术时间为 33 min,胆道出血 4 例,胆汁外渗漏 2 例,胆漏合并胆道出血 1 例,胆道引流管出现移位 1 例。两组并发症发生率分别为 5.71% 和 29.63% ( $P=0.03$ )。**结论** 彩超联合 DSA 引导下 PTCD 治疗 AOSC 效果明显优于 DSA 组,可明显缩短手术时间,减少并发症,降低病死率。

**【关键词】** 胆管炎;超声检查,多普勒,彩色;血管造影术,数字减影;穿刺抽液术

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.011

作者单位:010017 内蒙古自治区呼和浩特,内蒙古自治区人民医院介入诊疗科

## 带线锚钉在慢性踝关节外侧不稳韧带重建中的应用效果分析

马一鸣

**【摘要】** 目的 分析带线锚钉在慢性踝关节外侧不稳韧带重建中的应用效果。方法 回顾性分析 2012 年 6 月至 2014 年 6 月诊治的 77 例慢性踝关节外侧不稳患者的临床资料,全部患者均接受带线锚钉应用于手术韧带重建中,观察并对比治疗前后疗效指标,AOFAS 足踝及 VAS 评分,患者自我感觉。结果 治疗后,77 例患者踝关节内侧间隙、距骨倾斜角度与距骨移位距离分别为  $(3.62 \pm 0.49)$  mm、 $(3.39 \pm 0.7)$  °、 $(3.73 \pm 1.33)$  mm,均显著小于治疗前(均  $P < 0.01$ );同时 AOFAS 足踝评分显著高于治疗前,VAS 评分 [ $(3.85 \pm 1.56)$  分]显著低于治疗前 [ $(7.26 \pm 3.28)$  分] ( $P < 0.01$ );另外患者自我感觉优良率高达 92.21%。结论 带线锚钉应用于慢性踝关节外侧不稳韧带重建中效果显著,可积极改善患者足踝关节功能,减轻疼痛,具临床实际应用价值。

**【关键词】** 外侧韧带;踝;骨钉;修复外科手术

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.012

作者单位:312000 浙江省绍兴,绍兴第二医院骨二科

## 穴位注射治疗慢性咽炎 200 例临床分析

罗世柏 杨芳 何勇军

**【摘要】 目的** 探讨穴位注射治疗慢性咽炎的疗效。**方法** 选择门诊患者 320 例,按入院单双日不同分两组,治疗组 200 例,于天突穴注射治疗(地塞米松 5 mg + 2%利多卡因 1 mL),1 次/d,3 次为 1 个疗程;对照组 120 例,超声雾化吸入(庆大霉素 8 万 U + 地塞米松 5 mg),1 次/d,3 次为 1 个疗程。随访 3 个月,观察临床疗效。**结果** 治疗组总有效率 85.5% 对照组总有效率 68.3% 两组总有效率差异有统计意义( $P < 0.05$ )。**结论** 穴位注射治疗慢性咽炎方法简单、安全、效果显著,值得临床推广。

**【关键词】** 咽炎;穴位疗法;穴,天突

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.013

作者单位:418008 湖南省怀化,解放军第五三五医院耳鼻咽喉科



## 银离子敷料治疗糖尿病合并冠心病患者压疮一例

邓斯敏

**【摘要】** **目的** 观察银离子敷料对糖尿病合并冠心病患者压疮的治疗效果。**方法** 分析计算中药外敷及银离子敷料(美皮康)外敷治疗两种不同方法联合全身药物治疗患者压疮面积缩小率及深度减少率。**结果** 使用美皮康联合全身药物治疗压疮面积缩小率及深度减少率分别为 31%、50%;中药外敷治疗联合全身药物治疗压疮面积缩小率及深度减少率分别为 50%、40%,美皮康治疗深度减少率大于中药外敷,面积缩小率小于中药外敷。**结论** 美皮康对治疗糖尿病、冠心病患者压疮有效,且方便简单,值得临床应用。

**【关键词】** 压疮;糖尿病;冠心病;银离子敷料

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.014

作者单位:200010 上海市,上海市第二人民医院老年科

## 接种百日咳、白喉、破伤风混合疫苗 出现硬结反应的预防及处理

舒忠

**【摘要】 目的** 分析百日咳、白喉、破伤风混合疫苗(百白破疫苗,DTP 疫苗)接种后引起硬结副作用反应的病因、预防及处理方法。**方法** 对海军机关门诊部防疫科被接种 DTP 疫苗的 710 例幼儿进行接种后跟踪研究。**结果** 710 例接种 DTP 的幼儿,有皮下硬结的 113 例,发生率 15.92%,经正规护理治疗,均痊愈。**结论** 很好的 DTP 疫苗冷链管理,规范医护人员的技术水平,采用合格的疫苗,注射药物被充分摇匀,选择正确的注射部位,注射后及时让监护人充分了解相关注意事项及副反应,如何应对副反应,就能充分减少接种 DTP 疫苗的副作用的发生。

**【关键词】** 大规模疫苗接种;药物毒性;免疫疗法,主动;儿童

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.015

作者单位:100841 北京市,海军机关门诊部防疫科

## 自制中药油膏治疗糖尿病患者压疮一例

过源

**【摘要】** 目的 总结并发压疮的糖尿病患者的治疗、护理经验。**方法** 应用自行研发的 D 型中药油膏进行治疗,并记录治疗前、后的压疮改善情况。**结果** 该患者尾骶部压疮大小由 3.0 cm × 3.5 cm 缩小至 1.5 cm × 2.0 cm,深度减少约 0.3 cm;足跟部压疮愈合。**结论** D 型压疮油膏对糖尿病患者的压疮有较好的临床效果。

**【关键词】** 糖尿病并发症;压疮;中药油膏

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.016

作者单位:200011 上海市,上海市第二人民医院老年病科

## 阑尾炎误诊 147 例分析

王顺

**【摘要】** **目的** 分析阑尾炎误诊原因,提高其诊断水平。**方法** 1995-2013 年收治以阑尾炎诊断收治患者 2 120 例,误诊病例 147 例,对其误诊种类及原因进行分析。**结果** 急性阑尾炎误诊为其它疾病的 23 例(15.6%),其它疾病误诊为急性阑尾炎的 124 例(84.4%),均以肠蛔虫症误诊最多见。究其原因,除少数疑难、少见病例外,多数是因轻视本病,诊断上粗枝大叶所致。**结论** 认真分析病史,切实地全面检查,可以进一步减少阑尾炎的误诊率。

**【关键词】** 阑尾炎;误诊

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.017

作者单位:110043 辽宁省沈阳,沈阳二〇一医院外一科

## 特布他林联合布地奈德雾化吸入治疗老年痴呆症合并肺部感染一例

蔡悦珊 董兴刚

**【摘要】** 目的 总结老年性痴呆并发肺部感染的治疗经验。方法 在常规治疗、吸氧、抗感染、止咳、化痰及营养支持疗法的基础上,加用特布他林联合布地奈德雾化吸入治疗老年痴呆症合并肺部感染 1 例。雾化时间选择在饭前或饭后 1 h,上午及下午各 1 次,每次 15~20 min,不超过 30 min,治疗观察时间为 4 周。结果 该患者经治疗约 1 周,咳痰次数减少,痰量稍减少,呼吸困难程度减轻,血象有所下降,治疗 4 周上述症状痊愈。结论 特布他林联合布地奈德雾化吸入治疗老年痴呆症合并肺部感染有效改善炎症反应、咳嗽、咳痰、气喘、呼吸困难等临床症状,改善肺通气功能,疗效显著,值得临床推广。

**【关键词】** 呼吸道感染;特布他林;布地奈德;投药,吸入

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.018

作者单位:200011 上海市,上海市第二人民医院老年病科

## 含服盐酸达克罗宁胶浆致过敏性休克一例

黄书祥

女,42岁,门诊患者,因上腹部不适,胀痛一个多月拟于2015年6月1日早9:00行无痛胃镜镜检查术。术前检查心电图及传染指标正常,否认既往药物过敏史。入胃镜室后建立静脉通道,随后给予盐酸达克罗宁胶浆10 mL(0.1 g)(达已苏,批号:14083021,江苏泰州扬子江药业生产)口含1 min后服下,5 min后患者诉口咽部难受不适,吞咽困难,无呼吸困难,立即嘱患者平卧,并面罩吸氧,氧流量5 L/min,测BP 110/60 mmHg, P 86次/min, SpO<sub>2</sub> >90%,患者症状无好转,考虑患者为盐酸达克罗宁胶浆致过敏反应,给予地塞米松注射液10 mg静脉注射,此时患者面红,眼结膜红,嘴唇发红肿胀,以上嘴唇肿胀更为明显,无呼吸困难,BP开始下降,此时

BP 90/60 mmHg,立即建立第二静脉通道,并快速补液,输入乳酸钠林格液,并静脉注射盐酸麻黄碱注射液10 mg,每3分钟一次,共3次,BP无上升反而进一步下降,心率由86次/min降至50次/min,上嘴唇肿胀进一步加重,患者意识清楚,考虑患者为口服盐酸达克罗宁胶浆致过敏性休克,立即将盐酸肾上腺素注射液1 mg用0.9%氯化钠注射液稀释至20 mL,每次注射0.05 mg(1 mL),共两次,BP和心率开始上升,并再次静注地塞米松注射液10 mg约0.5 h后血压心率升至正常,面红消失,但嘴唇仍肿胀,但有减轻,抢救2 h后基本平稳,遂将患者转入内科病房继续对症治疗,至当日下午3:00完全恢复正常。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.019

作者单位:550200 贵州省修文县人民医院麻醉科

## 单硝酸异山梨酯注射液联合托拉塞米治疗 冠心病、心功能不全患者胸腔积液一例

刘琴 过源 冯健 董兴刚

女,90岁,反复胸闷、气促半年,加重1个月。活动后症状加重,经休息可缓解。夜间不可平卧。无发热、心悸、胸痛,有咳嗽咳痰。既往有冠心病史30年,近十年来活动后反复胸闷、气促。于2015年4月18日入院,入院查体:体温37℃,呼吸25次/min,心率80次/min,血压120/80 mmHg。神志清楚,高枕卧位,呼吸急促,口唇轻度发绀,颈静脉无怒张,双肺呼吸音弱,右下肺可闻及少许湿啰音,未闻及哮鸣音,左肺未闻及干湿性啰音,心率80次/min,律齐,各瓣膜听

诊区未闻及杂音。腹平软,无压痛,肝脾未触及。4月18日行X线胸片检查显示:双侧胸腔积液(右侧少量、左侧中量40 mm×60 mm);心影增大,呈靴形,肺门影增大;右下肺可见斑片状影,考虑右下肺感染。肝肾功能正常,血常规:白细胞 $12.9 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞0.72,Hb 120 g/L,PLT  $297 \times 10^9/L$ ,心肌酶(-)。BNP 650 pg/L。ECG:窦性心律,室性期前收缩,ST-T改变。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.020

作者单位:200011 上海市,上海市第二人民医院老年病科

## 颈动脉斑块稳定性与形态学研究进展

李秀文 杨庆彪 员伟强 吴文新

颈动脉粥样硬化斑块(carotid artery atherosclerotic plaque CAP)的出现是颈动脉硬化过程中常见的病理现象,与缺血性脑血管病的发生密切相关<sup>[1]</sup>。2003年,国际上达成共识,即统一用“易损斑块”来定义所有具有破裂倾向、易于发生血栓形成和/或进展迅速的危險斑块。易损斑块的形态学特

征包括薄纤维帽、较大的脂质核心、巨噬细胞等炎性细胞浸润以及斑块内出血等<sup>[2]</sup>。2013年 Gupta等<sup>[3]</sup>汇总分析了9项研究的779例病例,结果表明:不稳定斑块及斑块内成分对于卒中发生有重要的预测价值。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.021

作者单位:053000 河北省衡水,衡水市第五人民医院(脑科医院)神经内科(李秀文、杨庆彪、员伟强);河北医科大学第二医院病理科(吴文新)



## 湖北省鄂州市中心医院开展食源性疾病的监测 存在问题及对策

廖淑芳 陈先梅 廖青芳

**【摘要】** 目的 降低食源性疾病的发病率。方法 通过广泛开展宣传、培训、落实食源性疾病的监测责任制和深入开展食源性疾病的监测,提高对食源性疾病的监测预警能力。**结果** 进行广泛的流行病学调查,建立有效地食品溯源及召回系统,并以预防为主,防治并举,可有效解决食源性疾病存在的问题,从而有效降低食源性疾病的发病率。**结论** 预防为主,防治并举,可有效降低食源性疾病的发病率。

**【关键词】** 食源性疾病;人群监测;发病率

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.022

作者单位:436000 湖北省鄂州,鄂州市中心医院公共卫生科

## 电子巡更系统在医院后勤精细化管理中的应用成效

陈伯勋 杨少俊 李健 李承

电子巡更系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段<sup>[1]</sup>。巡更系统帮助管理

者了解巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.023

作者单位:431700 湖北省天门,天门市第一人民医院总务科(陈伯勋、杨少俊),信息科(李健),保卫科(李承)

## 子宫穿孔患者术后腹部切口裂开的护理

刘燕

**【摘要】 目的** 总结对子宫穿孔患者术后腹部切口裂开的护理经验。**方法** 1 例因子宫穿孔全麻下行经腹乙状结肠造瘘术 + 子宫修补术患者,在术后第 6 天切口裂开,即行切口二次减张缝合术。术后继续抗感染、加强营养、切口换药等护理。**结果** 患者病情稳定后出院,随访切口瘢痕愈合。**结论** 子宫穿孔患者术后腹部手术切口裂开的防治要特别注意降低腹压,及时清创、减张缝合,而良好的基础护理、切口护理等,十分有助于提高手术的成功率。

**【关键词】** 子宫穿孔;外科伤口裂开;护理

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.024

作者单位:232007 安徽省淮南,淮南朝阳医院

## 心理护理在急诊外科患者诊疗中的临床意义

范克英

**【摘要】 目的** 探讨心理护理在急诊外科患者诊疗中的临床意义。**方法** 回顾性分析某医院 2013 年 4 月至 2014 年 5 月外科急诊患者的护理工作方法。**结果** 1 300 例患者就诊时均根据不同病情给予相应的心理护理,很大程度上缓解了患者的紧张、焦虑、悲观、抑郁的情绪,使其树立了战胜疾病的信心;减少了医患纠纷,获得了满意的疗效。**结论** 心理护理在急诊患者的治疗过程中起着重要作用,通过良好的沟通技巧不仅可以解除患者对疾病的紧张、焦虑、悲观、抑郁的情绪,调动其主观能动性,树立战胜疾病的信心;同时能使患者信任医护人员,提高治疗效果,减少医患纠纷。

**【关键词】** 心理护理;信息交流;急诊处理

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.025

作者单位:036000 山西省朔州,朔州市第三人民医院护理部

## 改良压疮风险评估量表在普外科老年患者护理中的应用

肖雪梅

**【摘要】 目的** 探讨改良压疮风险评估量表在普外科老年患者护理中的应用效果。**方法** 选择普外科的老年患者 162 例,采用改良压疮风险评估量表进行风险评估,对于存在潜在压疮风险的患者或入院前已存在压疮的患者进行预警干预,观察其应用的效果。**结果** 入院前已存在Ⅱ期压疮者 2 例,入院后出现Ⅰ期压疮者 2 例,经处理后 3 例治愈,1 例好转出院,住院时间为 $(14.4 \pm 3.6)$  d。**结论** 采用自制改良压疮风险评估量表进行风险评估,制定周密有效地预防护理和治疗计划,可把压疮的发生率降到最低,取得令患者满意的效果。

**【关键词】** 压疮;护理;护理评估;危险性评估;普外科;老年人

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.026

作者单位:517400 广东省紫金县人民医院普外科

## 一对一优质护理在糖尿病合并酮症酸中毒患者中的应用

江志荣

**【摘要】 目的** 探讨糖尿病合并酮症酸中毒患者实施优质护理的方法。**方法** 对糖尿病合并酮症酸中毒患者实施一对一优质护理措施,如加强临床观察、对症护理、加强皮肤护理、饮食护理、心理护理、健康宣教。**结果** 通过对酮症酸中毒患者的系统优质护理,38 例患者中显效 32 例,有效 6 例。**结论** 一对一优质护理干预可提高患者正确认识疾病的危害性,配合治疗,减少并发症的发生,提高生存质量。

**【关键词】** 糖尿病酮症酸中毒;护理

---

DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2015.s2.027

作者单位:436000 湖北省鄂州,鄂州市中心医院内分泌科